


Ueber die
Zusammensetzung der Leitbündel
bei den
Gefäßkryptogamen.

Der hohen philosophischen Facultät
der
Universität zu Freiburg i. B.
als
Dissertation
zur Erlangung der Doctorwürde
vorgelegt

von
Henry Potonié
aus Berlin.

Freiburg in Baden 1884.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Ueber die Zusammensetzung der Leitbündel bei den Gefässkryptogamen.

Von

Henry Potonié,

Zweitem Assistenten des Kgl. botanischen Gartens zu Berlin.

(Mit einer Tafel.)

Vorbemerkung.

In den folgenden Blättern wird beabsichtigt, eine Betrachtung der Leitbündel-Structur der Gefässkryptogamen zu geben auf Grund anatomisch-physiologischer Principien im Sinne S. Schwendener's. Die Aufgabe der Pflanzen-Anatomie besteht hiernach in der Erkenntniss und Beschreibung des Baues und der Einrichtungen der Apparate, Organe, zum Zweck des Verständnisses der Beziehungen zwischen Bau und Function. Das erstrebte Ziel ist eine Physiologie der Gewebe: die Erkenntniss der Bedeutung der anatomischen Organe für das Leben der Gewächse.¹⁾

I. Zur Terminologie.

1.

Die Betrachtung der anatomischen Verhältnisse in der angegebenen Richtung hat zu neuen Begriffen geführt; solche aber verlangen neue Worte, und so wird naturgemäss im Folgenden die durch Schwendener und seine Schule geschaffene Terminologie Anwendung finden. Die übrigen Termini sind in der von A. de Bary in seiner Vergleichenden Anatomie²⁾ gebrauchten Fassung verworthen worden.

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass nach dem hier angedeuteten Standpunkte die Begriffe der Anatomie nicht bloß histologische, sondern wesentlich physiologische sein müssen, dass also das Hauptcriterium zur Bildung derselben physiologische Data bilden müssen. Nun ist es

1) Vergl. Schwendener's Akademische Antrittsrede im Monatsber. d. k. preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin vom Juli 1880, p. 621—623.

2) Leipzig, 1877.

selbstverständlich, dass manche gewisse Funktionen verrichtenden Organe bei gegebenen Elementen eine bestimmte Anordnung der letzteren und in manchen Fällen vielleicht auch, was übrigens noch specieller nachzuweisen wäre, eine besondere Entwicklung erfordern, um die ihnen zukommende Funktion überhaupt verrichten zu können. Soweit daher diese morphologischen Data durch die beabsichtigte Funktion nothwendig gefordert werden, treffen morphologische Eigenthümlichkeiten und physiologische Verrichtungen zusammen und das Organ lässt sich in allen Fällen morphologisch- (anatomisch-)physiologisch benennen. Aber sobald das Wesen einer Funktion einen grösseren Spielraum für die morphologische Gestaltung und Entwicklung zulässt, mit anderen Worten, wenn verschiedenartig gebaute und entwicklungsgeschichtlich auf ungleiche Weise entstandene Organe oder anatomische Systeme trotzdem der gleichen Funktion vorstehen, wie dies nicht selten vorkommt, so lässt sich ein für alle Pflanzen passender morphologisch-physiologischer Terminus für ein solches Organ nicht bilden.

Es soll hiermit nur auf die bekannte Thatsache hingewiesen werden, dass nicht überall eine bestimmte Funktion auch einen bei allen Arten durchaus übereinstimmenden Bau und noch weit weniger eine gleiche Entwicklung bedingt. Namentlich ist dann ein besonderer Bau eines anatomischen Organes am ehesten zu erwarten, wenn es durch Anpassung aus einem Organ, dessen Funktion ursprünglich eine andere war, entstanden ist. Solche Organe können nämlich noch in ihrem späteren Baue, besonders wenn die Anpassung neueren Datums ist, Eigenthümlichkeiten beibehalten, die an ihre frühere Funktion erinnern.

Es ist auch sonst eine allgemein anerkannte Thatsache, dass Bildungen, welche von der verschiedenartigsten morphologischen Natur sind, dennoch der gleichen Lebensverrichtung vorstehen können, und dass die Genesis von Organen mit übereinstimmender Funktion in so verschiedener Weise wie nur möglich vor sich gehen kann. Es kann eben dasselbe in verschiedener Weise erreicht werden; aber hierbei müssen doch immer Bau und Funktion in unmittelbarer Wechselbeziehung stehen: sie dürfen sich nicht widersprechen. Die Construction eines Apparates ist abhängig von dem, was er leisten soll.

In Uebereinstimmung mit der angedeuteten Aufgabe der Anatomie werden wir also im Folgenden überall, wo unsere Kenntnisse es uns gestatten, bei der Wahl der Begriffe in erster Linie nach physiologischen Gesichtspunkten verfahren.

In diesem Sinne soll nun im Folgenden für die Gefässkryptogamen eine Begriffsbestimmung des Wortes Leitbündel und seiner Systeme versucht und sodann eine Betrachtung der Anordnung der Bündel-Elemente bei den verschiedenen Abtheilungen der Farne vorgenommen werden.

2.

Die Nomenclatur der Gewebe-Arten der Farnkräuter ist durch Herübernahme der für die Phanerogamen gebrauchten Begriffe geschaffen worden. Diejenigen Systeme, welche in irgend einer Beziehung in physiologischer oder rein morphologischer (genetischer) Hinsicht eine Aehnlichkeit mit den Systemen der Phanerogamen aufwiesen, erhielten die gleichen Bezeichnungen. So pflegt man bei den Filicineen das Gewebe der Leitbündel in Phloëm und Xylem einzutheilen. Allein wenn man hieraus den Schluss ziehen wollte, dass durch diese Bezeichnungsweise auf eine gleichartige Construction oder Funktion der betreffenden Gewebe-Theile gedeutet werden soll, so würde man bekanntlich fehlgehen. Es haben also die Begriffe Phloëm und Xylem keinen physiologischen Sinn; aber auch ein morphologischer Sinn kommt ihnen ebensowenig zu. C. Nägeli¹⁾ hatte ursprünglich die genannten Ausdrücke nur mit Rücksicht auf die Lage der damit bezeichneten Gewebetheile zum Cambium aufgestellt. Ein solches Cambium kommt nun bei den Farnkräutern, mit Ausnahme eines später zu erwähnenden, obendrein zweifelhaften Falles, gar nicht vor.

Die Uebertragung geschah auf Grund einiger Elemente, die im Xylem und Phloëm der Phanerogamen sich regelmässig finden und deren physiologische Aequivalente bei den Gefässkryptogamen ebenfalls in getrennten Bündeltheilen vorkommen. Es sind dies die Tracheiden²⁾ der Farnkräuter und die Gefässe bei den Phanerogamen im Xylem und die Siebelemente der Gefässkryptogamen und Phanerogamen im Phloëm. Zu diesen kommen gewöhnlich bei den Farnkräutern und Phanerogamen vorwiegend Stärke führende parenchymatische Zellen, die sowohl den Tracheen als auch dem Siebtheil beigemischt sein können. Die Phanerogamen jedoch besitzen meist daneben noch Elemente in ihrem Xylem und Phloëm, welche, wenn sie bei den Filicineen vorkommen, gewöhnlich das Bündel zu äusserst umgeben, oder diesem doch aussen angelagert erscheinen. Es ist dies der echte Bast im Phloëm und das Libriform im Xylem der Dicotylen und die diesen Geweben anatomisch und physiologisch entsprechenden sogenannten Sklerenchym-Scheiden und -Belege der Gefässkryptogamen. Wenn nun auch die gleiche Anordnung der echten Bastzellen bei den Phanerogamen vorkommt (*Monocotylen*, *Primulaceen*) und auch in diesem Falle dieselben von den meisten Autoren nicht zum Bündel, sondern zum „Grundgewebe“ gerechnet werden, so fehlen doch diesen Phanerogamen — in ihrem Phloëm wenigstens — die Stärke führenden parenchymatischen mit dem Holzparenchym übereinstimmenden Zellen. F. Hegelmaier sagt daher

1) Beiträge zur wissenschaftlichen Botanik, Leipzig 1859, I, p. 9.

2) Wir werden später sehen, dass dieser Ausdruck zu verwerfen ist. Vorläufig behalte ich ihn noch bei.

auch¹⁾, dass die Anwendung der Begriffe Phloëm und Xylem auf die jetzt so genannten Theile der *Lycopodien*-Bündel etwas Willkürliches hat. Xylem und Phloëm ist also bei den Gefässkryptogamen etwas anderes als bei den Phanerogamen. Es kann nach dem Gesagten hier unter Phloëm weiter nichts als der die Siebelemente enthaltende Theil und unter Xylem der die Tracheen umfassende Theil des Bündels verstanden werden, ohne mit diesen Begriffen eine bestimmte Umgrenzung der bezüglichen Gewebetheile zu verbinden.

E. Russow²⁾ legt den Begriffen Xylem und Phloëm eine morphologische Bedeutung bei in descendenz-theoretischem Sinne. Er stellt sich vor, dass das Phloëm der Phanerogamen genetisch mit dem Phloëm der Filicineen zusammenhängt und ebenso für das Xylem. Indessen ist diese Anschauung so äusserst hypothetischer Natur, dass man diese vorläufig und vermuthlich überhaupt nicht zu begründende Meinung auch nicht als Grundlage weiterer Untersuchungen verwerthen sollte. Die „Sklerenchymbelege“, welche oft die Bündel der Farnkräuter umgeben, hängen nach dem genannten Autor³⁾ ebenfalls mit den Bastcheiden, wie sie häufig Phanerogamen (*Monocotylen*, *Primulaceen* u. a.) zeigen, phylogenetisch zusammen. Russow⁴⁾ giebt an, dass bei den Phanerogamen wie bei den Filicineen die Bastbelege aus dem Grundgewebe entstünden; allein in den Fällen, wie sie G. Haberlandt⁵⁾ beschreibt, wo nämlich eine einheitliche Cambiumanlage der Mestombündel und ihrer Stereombelege angetroffen wird, stösst diese Auffassung auf Widersprüche.

II. Der Begriff des Leitbündels bei den Gefässkryptogamen.

Ein Leitbündel ist eine anatomisch-physiologische Einheit hoher Ordnung. Demselben liegt ob, Nährstoffe und Wasser nach den Stellen des Verbrauchs und nach den Aufspeicherungsorten hin zu befördern. Daneben dienen die Bündel in vielen Organen offenbar als Nährstoff- und Wasserreservoir.

In vielen Fällen werden die Bündel von einer Skelet-Röhre oder von Skelet-Strängen („Sklerenchymbelege“) begleitet, und da diese unzweifelhaft zum Schutz des Bündels gegen mechanische Einflüsse vorhanden sind und daher physiologisch zum Bündel gehören, so müssen naturgemäss diese Skelet-Apparate auch zum Bündel gerechnet werden.

1) Botan. Zeitung 1872, Spalte 776.

2) Betrachtungen über das Leitbündel- und Grundgewebe etc. Dorpat, 1875.

3) l. c. p. 8.

4) l. c. p. 6 etc.

5) Die Entwicklungsgeschichte des mechanischen Gewebesystems der Pflanzen, Leipzig, 1879, p. 19—25.

Sie entstehen, wie Haberlandt¹⁾ für die Phanerogamen nachgewiesen hat, entweder aus Procambium oder, wie wir später für die Farnkräuter sehen werden, aus dem Grundparenchym. — Als Grundparenchym bezeichnet Haberlandt²⁾ jenes Gewebe, „welches in der jungen Sprossspitze nach Anlage sämtlicher aus dem Urmeristem hervorgehender Cambiummassen und der Epidermis übrig bleibt.“

Will man nur die Nahrung und Wasser leitenden Elemente zusammenfassen, so besitzen wir hierfür den von Schwendener³⁾ eingeführten Ausdruck Mestom. Derselbe ist schon deshalb nothwendig, weil bei manchen Farnkräutern, z. B. im Blattstiel von *Gleichenia dicarpa*, *Hymenophyllum demissum* und *Lygodium japonicum* das ganze Grundparenchym in mechanisches Gewebe, Stereom, übergeht, welches in diesen Fällen nicht allein die Mestom-Elemente einschliesst und schützt, sondern gleichzeitig das biegungsfeste Gerüst des Stieles vorstellt. Aehnlich ist es bei den Baumfarn, den *Cyatheaceen*. Hier werden die grossen peripherischen, häufig V- oder W-förmig gebogenen Mestombündel ebenfalls von Stereom umgeben, welches zugleich das biegungsfeste Gerüst des Stammes ist; aber es bleibt ausserdem nicht in Skelet übergegangenes dünnwandiges Grundparenchym übrig, und zwischen der Schutzscheide und den Skelet-Bändern findet sich ebenfalls reichlich Stärke führendes Grundparenchym. Da wir jedoch von dem letzteren nicht wissen, in wie weit es zu den Mestomelementen innerhalb der Schutzscheide in physiologischer Wechselbeziehung steht, so bleibt bis auf Weiteres unentschieden, ob es sich empfiehlt das in Rede stehende Gewebe der Baumfarn zum Bündel zu rechnen oder nicht. Dass auch die Schutzscheide in den meisten Fällen — vor allem da, wo es Einzelscheiden sind — zweckmässig zum Bündel gerechnet wird, ist, wenn man ihr Auftreten berücksichtigt, welches auf eine innige Beziehung zum Bündel weist, selbstverständlich.

Die Stärke führenden Parenchymstränge innerhalb der hohlecylindrischen Leitbündel von *Marsilia* rechnet man am besten nicht mit zum Bündel, weil die vorhandene innere Schutzscheide auf eine physiologische Abgrenzung des Mestoms hindeutet. Will man aber im Stamme der *Schizaeaceen* das centrale Stärkeparenchym als Bestandtheil des Bündels auffassen, so ist nichts dagegen einzuwenden, da wir nicht wissen, in welchem physiologischen Verhältniss der axile Markparenchymcylinder zu den übrigen Bündel-Elementen steht. Dieser starke axile, von Tracheiden umgebene Markparenchymcylinder im Stamme der *Schizaea-*

1) l. c. p. 10.

2) l. c. p. 6.

3) Das mechanische Princip im anatomischen Bau der Monocotylen mit vergleichenden Ausblicken auf die übrigen Pflanzenklassen. Leipzig, 1874, p. 5 und p. 18.

ceen wird von Russow¹⁾, dem De Bary²⁾ folgt, mit zum Bündel gerechnet, weil derselbe nicht durch eine Schutzscheide von dem mehrreihigen lückenlosen umgebenden Tracheidenring geschieden wird. Unserer Meinung nach kann also erst dann über den centralen Markcylinder verfügt werden, wenn wir wissen, ob er zu den Tracheiden in physiologischer Beziehung steht, ob er etwa z. B., wie anzunehmen ist, die gleiche Funktion hat, wie die Stärke führenden Parenchymzellen zwischen den Tracheiden bei vielen Farnkräutern, oder ob sein Vorhandensein für die Funktion der übrigen Bündelelemente im Wesentlichen ohne Einfluss bleibt. Auch wir möchten den Markstrang als Bündel-Bestandtheil auffassen, aber, wie wir sehen, aus einem physiologischen Grunde.

Der Begriff Leitbündel ist also ein weiter, je nach Umständen mehr oder weniger Gewebe-Systeme zusammenfassender. Eine scharfe Umgrenzung ist auch desshalb kein Bedürfniss, weil vermitteltst der übrigen im Nachfolgenden bei der Aufzählung der Gewebe-Systeme gebrauchten Terminologie in praktischer Weise eine Verständigung erzielt werden kann, da dieselbe eine bestimmte und scharfe Begrenzung der Gewebetheile, wie sie gerade gebraucht wird, gestattet. Im Uebrigen müsste, wenn der Begriff Leitbündel bestimmter gefasst würde, ein anderer ebenso allgemeiner Terminus an seine Stelle gesetzt werden.

III. Die physiologischen Gewebe-Systeme der Leitbündel.

A. Allgemeines.

Unsere jetzigen anatomisch-physiologischen Kenntnisse gestatten es uns die Gewebe der Bündel in eine gewisse Anzahl von Systemen aufzulösen, von welchen jedes eine besondere Funktion versieht. Diese Zusammenfassung bestimmter übereinstimmend gebauter Zellcomplexe zu einheitlichen physiologischen Systemen hat den Vortheil, dass sich dieselben bei den verschiedenen Pflanzenabtheilungen miteinander vergleichen lassen, was, wie gezeigt wurde, mit dem Pbloëm und Xylem weder morphologisch noch physiologisch möglich ist. Wir dürfen uns allerdings nicht verhehlen, dass wir über die Funktion der Systeme häufig nichts weiter als nur eine schwache Vorstellung haben; aber unzweifelhaft kommt man auf diesem Wege weiter als durch den Vergleich sicher heterogener Dinge. Wir kennen, wie wir sagen dürfen, mit aller Bestimmtheit durch Schwendener's Arbeit die Funktion der in den Bündeln der Phanerogamen vorhandenen echten Bastzellen und der Libriformzellen, sowie der sog. Sklerenchymscheiden der Farn-

1) Vergleichende Untersuchungen etc. St. Petersburg, 1872 (Mémoires de l'acad. impér. des sciences de St. Petersb., VII. série. Tome XIX, No. 1), p. 97—98.

2) l. c. p. 357.

kräuter. Auch über die Bedeutung der Gefässe und Tracheiden haben wir jetzt, wie wir später anführen werden, eine bestimmtere Vorstellung. Und wenn wir auch bislang eine weniger genaue Einsicht in die Lebensverrichtungen des Siebtheils und der stärkeführenden parenchymatischen Zellen (Holzparenchym, Geleitzellen Russow's bei den Farnkräutern) besitzen, so lässt sich doch nicht gut bezweifeln, dass die genannten Gewebearten ihnen besonders obliegende Funktionen haben. Es lassen sich durchaus annehmbare und auch wirklich acceptirte Vorstellungen über die ihnen zugewiesene Thätigkeit machen.

Von Systemen höherer Ordnung lässt sich dann sprechen, wenn zwei oder mehrere Systeme ersten Grades, wie die eben erwähnten, unmittelbar von einander abhängig sind oder in einer gewissen näheren Beziehung zu einander stehen. Dies ist z. B. nach neueren Untersuchungen der Fall mit dem trachealen, oder wie man jetzt besser sagen muss, hydralen System, welches regelmässig in unmittelbarer Verbindung mit Holzparenchym (Phanerogamen) resp. Geleitzellen (Farnkräuter) auftritt. Haberlandt¹⁾ sah sich aus diesem Grunde auch veranlasst, dieses Gewebe-System höherer Ordnung mit dem besonderen Namen Hadrom zu belegen. Die Sache liegt also derart, dass wir nach unseren jetzigen Kenntnissen anatomisch-physiologische Gewebesysteme aufstellen können, obgleich wir nicht mit derselben Gewissheit und Klarheit die physiologische Bedeutung aller Systeme durchschauen.

In dem Folgenden soll nun der Versuch gemacht werden, die Systeme, welche sich aus den die Bündel der Gefässkryptogamen zusammensetzenden Gewebeelementen zusammenstellen lassen, kurz zu characterisiren.

B. Specielles.

Die Leitbündel werden aus folgenden anatomisch unterschiedenen Gewebe-Systemen zusammengesetzt:

1. Das Stereom, 2. das Hydrom (Tracheom), 3. das Amylom, 4. das aus dem Hydrom und einem Theil des Amyloms gebildete System höherer Ordnung das Hadrom, 5. das Leptom, 6. die Endodermis, 7. das Cambium, 8(?) das Lückenparenchym.

1.

Das seiner Funktion nach bekannteste ist unzweifelhaft das von Schwendener²⁾ **Stereom** genannte und als specifisch mechanisches System erkannte Gewebe. Es gehören zu demselben der echte Bast im Phloëm und die Holzzellen, Libriformzellen Sanio's des Xylems der Phanerogamen.

1) l. c. p. 5—6.

2) Mech. Pr. p. 154—155.

Von den Farnkräutern gehören die sog. Sklerenchym-Scheiden und -Belege hierher. Dass das Gewebe dieser Scheiden und Belege aus typischen mechanischen Zellen, Stereiden, besteht, hat bereits Schwendener¹⁾ hervorgehoben; zuweilen leiten oder speichern sie gleichzeitig, da es ihrer Hauptfunktion nicht widerspricht, wie dies auch bei den Phanerogamen vorkommt, Stärke in sich auf (*Alsophila*). Stereiden-scheiden und Stränge zum Schutz des Mestoms kommen häufig in Wurzeln, Rhizomen und Blattstielen vor. Entweder wird das ganze Bündel röhrenförmig von einem ein- bis mehrschichtigen Stereom-Cylinder umgeben, oder die Bündel werden nur von Strängen aus Skeletzellen begleitet, die namentlich gern die einspringenden Winkel der Bündel aufsuchen. Ist die Aussenröhre einschichtig, so sind häufig nur die auf der dem Bündel zugewandten Seite befindlichen Membranen verdickt.

In Wurzeln findet sich ein Stereom-Cylinder nach Ph. van Tieghem²⁾ und nach eigenen Untersuchungen bei *Aspidium Lonchitis*, *Blechnum occidentale*, *Davallia canariensis*, *Nephrodium dilatatum*, *N. Filix mas*, *Nephrolepis platyotis*, *Polypodium vulgare*, *Pteris aquilina*, *Scolopendrium vulgare*.

In Rhizomen oder Blattstielen oder in beiden gleichzeitig erwähnen Russow³⁾, Schwendener⁴⁾, De Bary⁵⁾ und E. de Janczewski⁶⁾, Skelet-Bekleidungen bei *Asplenium*, *Blechnum brasiliense*, *Cyathea medullaris*, *Davallia dissecta*, *D. elegans*, *Dicksonia antarctica*, *D. Culcita*, *D. rubiginosa*, *Didymochlaena lunulata*, *Hymenophyllum*, *Osmunda regalis*, *Platynerium alaicorne*, *Polybotrya Meyeriana*, *Polypodium Lingua*, *P. Phyllitidis*, *P. pustulatum*, *Scolopendrium*, *Stenochlaena scandens*, *S. sorbifolia*.

Ausser diesen ausserhalb der Mestomtheile auftretenden Skelet-Geweben kommen jedoch auch bei den Gefässkryptogamen gerade wie bei den in die Dicke wachsenden Phanerogamen innerhalb des Bündels zwischen den Mestomelementen echte Stereiden vor, die von De Bary⁷⁾ als „gelbe Fasersklerenchymzellen“ bezeichnet werden.

Schon G. Mettenius⁸⁾ hatte auf „mehr oder minder scharf umgrenzte Bündel prosenchymatischer Zellen“ in den Blattstiel-Bündeln von *Trichomanes pinnatum* und *T. elegans* aufmerksam gemacht, „die

1) Mech. Pr. p. 4.

2) Recherches sur la symétrie de structure des plantes vasculaires. (Annales des sciences nat. Botanique. V. série. Tome XIII, Paris, 1870—1871.) p. 66—67.

3) Vergl. Unt. p. 81, 99.

4) Mech. Pr. p. 162.

5) Vergl. Anat. p. 444.

6) Etudes comparées sur les tubes cribreux. (Mémoire de la Société nationale des Sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg, T. XXIII.) 1881, p. 216.

7) Vergl. Anat. p. 358.

8) Ueber die Hymenophyllaceae (Abhandlungen der math.-physischen Classe der königl. sächs. Gesellsch. der Wiss. VII.) Leipzig, 1865, p. 420—21.

durch die bedeutende Stärke, die gelbe Farbe ihrer Wandungen, die punktförmigen oder elliptischen entfernter stehenden Tüpfel auffallend von den treppenförmigen Zellen abweichen. Russow¹⁾ hat solche Zellen auch bei *Trichomanes floribundum* gefunden. Dieser Autor lässt es dahingestellt, ob die in Rede stehenden Zellen bei den *Hymenophyllaceen* nicht vielleicht verdickte und verholzte Leitzellen darstellen²⁾. Die von K. Prantl³⁾ erwähnten „langgezogenen, prosenchymatischen, dickwandigen, inhaltsarmen Zellen“, welche im Blattstiel bei den Arten aus den Sectionen *Davalliopsis* und *Feea* das Centrum des Bündels einnehmen, bezeichnet der genannte Autor als „Holzzellen“. Ich selbst habe diese Elemente bei *Trichomanes Prieurii* Kze. untersucht und echte Stereiden gefunden, nämlich lang prosenchymatisch gestreckte Zellen mit kleinen runden oder spaltenförmigen, linksschief oder horizontal gestellten Tüpfeln. Auch konnte ich durch direkte Zugversuche constatiren, dass diese Stereiden eine ganz bedeutende Festigkeit besitzen.

Nach Russow⁴⁾ finden sich ausserdem Stereiden innerhalb des Mestoms bei *Aneimia*-, *Gleichenia*- und *Schizaea*-Arten. Er beschreibt sie als gelb tingirt⁵⁾, „sehr lang gestreckte, fein zugespitzte, dickwandige, verholzte Zellen, die den echten Bastzellen oder Libriformzellen genau gleichen.“ Prantl⁶⁾ sagt von den „bastähnlichen Fasern“ der *Schizaeaceen*: „Ihr Bau kommt . . . sehr nahe mit den Protophloëmelementen überein,“ so dass in jüngeren Entwicklungsstadien die Fasern von den Protophloëmzellen ihrem Baue nach absolut nicht zu unterscheiden seien. Sie sind stark prosenchymatisch und ihre in der Regel verholzten Wandungen besitzen zahlreiche runde Tüpfel. „Bei *Lygodium flexuosum* vertreten sie geradezu die bei *L. japonicum* an der correspondirenden Stelle vorhandenen Siebröhren.“⁷⁾

Ich untersuchte diese „bastähnlichen Fasern“ in den Bündeln von *Schizaea Pennula* und *Aneimia hirta*. Sie zeigten sehr dickwandige Membranen mit horizontalen schmalen, mehr oder weniger zahlreichen Tüpfeln, die zuweilen, wie es scheint, gänzlich fehlen können, aber auch an manchen Stellen sehr dicht stehen. Die Zellen sind sehr lang prosenchymatisch. Bei *Aneimia hirta* sind die Tüpfel klein, rund und stehen besonders dicht auf den sehr stark geneigten Querscheidewänden.

1) Vergl. Unt. p. 95.

2) Betracht. p. 20.

3) Untersuchungen zur Morphologie der Gefässkryptogamen. I. Die Hymenophyllaceen. Leipzig, 1875. p. 22.

4) Vergl. Unt. p. 79, 96, 98.

5) V. U. p. 6, 96—97.

6) Unt. zur Morph. d. Gefässkrypt. II. Die Schizaeaceen. Leipzig, 1881. p. 28.

7) Schizaeac. p. 29.

Das Vorkommen von Stereiden innerhalb der Leitbündel ist keineswegs auf die beiden genannten Familien beschränkt, sondern sie finden sich auch bei den *Polypodiaceen* und *Lycopodiaceen*. Bei den letzteren wird nach Russow das Centrum gewisser Bündel von *Psilotum* und *Tmesipteris* von einem Stereomstrang eingenommen. Bei den *Polypodiaceen* und zwar bei *Adiantum trapeziforme* wurde ich auf die Stereiden durch eine Bemerkung A. Trécul's¹⁾ aufmerksam gemacht, welcher Autor angiebt, dass bei dem genannten Farn an Stelle der kleineren Elemente des Siebtheils Zellen vorkämen, die sich von Stereiden („fibres du liber“) nicht unterscheiden. Wenn ich nun auch diese Angabe nicht bestätigen kann, da die bezeichnete Farn-Art einen wohl ausgebildeten Siebtheil besitzt, so fand ich doch, durch Stärke führende Parenchymzellen getrennt oder den Tracheiden unmittelbar anliegend, namentlich in den einspringenden Winkeln der Pole der Tracheidenplatte, einzeln oder in Gruppen, echte, sehr langgestreckte Stereiden mit kleinen, schiefen, elliptisch spaltenförmigen oder runden Tüpfeln. Die Anzahl der Tüpfel ist an den verschiedenen Zellen variabel. Wo ich es mit Bestimmtheit ausmachen konnte, fand ich die Tüpfel, wie dies die Stereiden bisher in der Regel zeigten²⁾, linksschief angeordnet. — Vergl. die Fig. 1 und ihre Erklärung. — Mit der J. Wiesner'schen Reaktion auf Holzstoff, Salzsäure und Phloroglucin behandelt, färbten sich die Stereiden ebenso wie die Tracheiden schön rosenroth.

Die Analogie zwingt uns anzunehmen, dass die Hauptfunktion der beschriebenen „den echten Bastzellen ähnlichen Fasern“, welche die Tracheiden in den erwähnten Fällen begleiten, in einer mechanischen Leistung besteht. Nur sind wir allerdings bislang nicht im Stande, die Art der mechanischen Inanspruchnahme dieser Zellen anzugeben. Wir müssen wegen seines Baues nichtsdestoweniger bis auf Weiteres dieses Gewebe als Stereom auffassen. Russow³⁾ steht aus demselben Grunde nicht an, die Fasern mit dem Ausdruck „Libriform“ zu bezeichnen; eine Gewebeart, die aus echten Skeletzellen besteht.

2.

Als zweites System führen wir das Tracheom an, ein Name, der von M. Westermaier⁴⁾ für das aus den Tracheen zusammengesetzte Gewebe vorgeschlagen wurde; allein das in Rede stehende Gewebe ist in physiologischer Hinsicht nicht das „tracheale System“ der Pflanzen, denn neuere, im botanischen Institut Schwendener's durch

1) Sur la position des trachées dans les fougères. (Ann. d. Sc. nat. 5. Sér. T. X, 1869, 344 ff., T. XII, 1869, 219 ff.) p. 345.

2) Schwendener, Mechan. Princip. p. 8.

3) Vergl. Unt. p. 164.

4) J. Troschel, Untersuchungen über das Mestom im Holze der dicotylen Laubbäume. (Verhandl. des bot. Ver. der Provinz Brandenburg.) Berlin, 1880, p. 93.

G. Volken¹⁾ ausgeführte Untersuchungen haben ergeben, dass die Fr. v. Höhnel'sche²⁾ Auffassung über die Funktion der Gefässe der Wahrheit am nächsten kommt. Nach diesem Autor stellen die Gefässe das specifisch Wasser leitende oder als Wasserreservoir dienende Gewebe dar, und ich möchte daher, weil diese Auffassung als die begründetste erscheint, die Bezeichnung Tracheom mit **Hydrom** vertauschen³⁾ und die Elemente dieses Gewebes dementsprechend als Hydroiden bezeichnen.

Die Hydroiden der *Gymnospermen* stellen gleichzeitig das mechanische Gewebe derselben dar, so dass bei diesen Gewächsen von einem und demselben Gewebe zwei Funktionen versehen werden. Dieses Verhältniss drücken wir am einfachsten aus durch die Bezeichnung der Elemente als Hydro-Stereiden.

Gewöhnlich sind sämmtliche Hydroiden eines Bündels bei den Farn untereinander verbunden. Zuweilen wie nach De Bary⁴⁾ in den Blattstielen von *Aspidium molle* und *Polypodium phymatodes* erscheint der Gefässstheil auf dem Querschnitt in zwei symmetrische Gruppen gespalten. Auch bei *Equisetum* u. A. verlaufen die Hydroiden in einigen Gruppen getrennt.

Wenn mehrere Hydroiden nebeneinander liegen, werden sie in der Regel von parenchymatischen Zellen, die als „Amylom-Elemente“ besonders betrachtet werden müssen, unterbrochen.

Die Stereiden und Hydroiden sind nahe mit einander verwandt. Die Hydroiden sind verholzt und recht fest, so dass sie entschieden auch zur Festigkeit des Bündels beizutragen bestimmt sind. Nach Entfernung stereidenloser Bündel aus dem umgebenden Gewebe, was sich namentlich ohne Schwierigkeit an Blattstielen ausführen lässt, kann man durch direkte Zugversuche die nicht unbedeutende Festigkeit prüfen. Die Bündel scheinen überhaupt mechanisch schutzbedürftig zu sein, worauf ja schon die mechanischen peripherischen Belege hinweisen. Dort wo zur Herstellung einer grösseren Festigkeit innerhalb des Mestoms eine theilweise Theilung der Arbeit durch Entwicklung von echten Stereiden neben den Hydroiden wie bei *Adiantum trapeziforme* stattgefunden hat, macht es den Eindruck, als ob die Stereiden

1) Ueber Wasserausscheidung in liquider Form an den Blättern höherer Pflanzen. In dem vorliegenden II. Bande dieses Jahrbuchs.

2) Ueber den negativen Druck der Gefässluft. Inaugural-Dissert. — Beiträge zur Kenntniss der Luft- und Saftbewegung in der Pflanze. In Pringsheim's Jahrb. 1879.

3) Es ist im Grunde gleichgiltig, wie man eine Sache nennt, vorausgesetzt, dass man sich versteht. Aber wer wollte leugnen, dass eine gute, zweckmässige Terminologie ein äusserst werthvoller Apparat für die Forschung ist. Aus diesem Grunde schlage ich den obigen, in die Schwendener'sche Nomenclatur hineinpassenden Namen vor.

4) Vergl. Anat. p. 355.

phylogenetisch aus Hydroiden entstanden seien. In den Stielen der fruchtbaren Wedel von *Blechnum Spicant* fand ich Hydroiden mit sehr weit auseinandergerückten grossen, sehr linksschief gestellten, spaltenförmigen Tüpfeln, die man beim ersten Blick für ausnahmsweise weitelumige Stereïden halten möchte. Von den vollkommenen Gefässen durch die Hydro-Stereïden der Coniferen bis zu den tüpfellosen, äusserst englumigen oder lumenlosen Stereïden kommen bekanntlich alle Uebergänge vor und zwar nicht nur in morphologischer, sondern ebensowohl in physiologischer Hinsicht. Denn die Hydrostereïden der Coniferen haben, wie wir dies durch den Namen schon ausdrückten, nicht allein die Aufgabe das Wasser zu leiten, sondern sie sind ausserdem die mechanischen Elemente. Diese Erscheinungen legen die Vermuthung nahe, dass in manchen Fällen entweder die typischen Stereïden phylogenetisch durch allmähliche Umbildung aus Hydroiden entstanden sind oder aber umgekehrt. Es ist aber auch möglich, dass ursprünglich nur eine Gewebeart vorhanden war, welche, wie das Hydro-Stereom der Coniferen, die beiden in Rede stehenden Funktionen versah und dass erst dann durch Theilung der Arbeit die beiden anatomisch-physiologisch ganz differenten Gewebe-Systeme, das Stereom und Hydrom, entstanden sind.

3.

Amylom nennt J. Troschel¹⁾ das System, welches durch die Elemente des Holzparenchyms und der Markstrahlen des Xylems und Phloëms der Phanerogamen gebildet wird. Diese Gewebe bilden, wie genannter Autor ausführlich nachwies und Schwendener²⁾ bereits auf Grund des anatomischen Befundes ausgesprochen hatte, ein untereinander zusammenhängendes System. Vereinzelte, nicht mit anderen Holzparenchymzellen in Verbindung stehende gleichnamige Elemente kommen niemals vor. Die Aufgabe des Amyloms besteht darin, die Kohlenhydrate, also Stärke, Inulin, Oel, Zucker, Gerbstoff, zu leiten und zur Zeit der Vegetationsruhe aufzuspeichern. Dort wo kein Holzparenchym vorkommt, wie bei *Berberis*, haben Stereïden (Libriform) die Nebenfunktion, welche als Hauptfunktion das Amylom auszeichnet. Bei *Berberis* dient also das Libriform auch zur Aufspeicherung von Stärke.

Die in anatomischer Hinsicht und wegen der Inhalts-Beschaffenheit mit den Amylom-Elementen der Phanerogamen zunächst zu vergleichenden Zellen der Gefässkryptogamen-Bündel sind die parenchymatischen, namentlich zur Zeit der Vegetationsruhe vorwiegend Stärke und

1) J. Troschel, Untersuchungen über das Mestom im Holze der dicotylen Laubbäume. (Verhandl. des bot. Ver. der Provinz Brandenburg.) Berlin, 1880, p. 81.

2) Mechan. Princip, p. 153, Anm. 1.

in oberirdischen Organen auch Chorophyllkörner führenden Zellen. Schon L. Dippel¹⁾ betrachtet die in Rede stehenden Zellen „als dem Holzparenchym der Phanerogamen entsprechend.“ Auch J. Sachs²⁾ identifiziert das Stärkeparenchym mit dem Holzparenchym der Phanerogamen. Nach Russow's³⁾ Nomenclatur gehören hierher seine Phloëm- und Xylemscheide und die Geleit- oder Leitzellen⁴⁾. Sie bilden die Grundmasse des Bündels, „in welche die faserigen und gefässartigen Elemente eingesenkt sind.“

Prantl⁵⁾ nennt das „regelmässig Stärke, bei *Lygodium* auch Chlorophyll“ enthaltende Amylom der *Schizaeaceen* einfach „Strangparenchym.“ Ein ebenfalls schon von Russow⁶⁾ vorgeschlagener Terminus.

Wie bei den Phanerogamen gewöhnlich sind auch zuweilen die Membranen der Amylomelemente der Farnkräuter mit einfachen runden Tüpfeln besetzt. Bei *Marsilia* finden sich nach Russow⁷⁾ nur „spärlich getüpfelte“ Wände und bei den *Schizaeaceen* fand Prantl⁸⁾ einfache runde Tüpfel und zwar besonders zahlreich im axilen Gewebe des Stammes von *Schizaea Pennula* auf den Querwänden; sonst kommen hier auch homogene Wandungen vor. Aus der reichlicheren Tüpfelung der Querwände muss auf eine Leitung der Nährstoffe in der Längsrichtung geschlossen werden.

Um jedoch die bezeichneten Elemente in physiologischer Hinsicht als Amylom auffassen zu dürfen, ist der Nachweis zu liefern, dass dieselben ebenso wie die correspondirenden Zellen bei den Phanerogamen untereinander in Verbindung stehen, also ein zusammenhängendes System bilden.

Nach den Darstellungen der Anatomen könnte es scheinen — obgleich sie es vielleicht nicht so meinen, da es sich in den gegebenen Fällen immer nur um Querschnittsansichten handelt — als ob die in anatomischer Beziehung mit den Amylomzellen der Phanerogamen übereinstimmenden Elemente einzeln und zusammenhangslos zwischen den Hydroiden bei den Farnkräutern vorkämen. Sachs⁹⁾ z. B. sagt nur: „Zwischen den Gefässen liegen enge, dünnwandige, im Winter stärke-

1) Ueber die Zusammensetzung des Gefässbündels der Kryptogamen. (In dem amtl. Bericht über die 39. Vers. deutscher Naturforscher u. Aerzte in Giessen im April 1864. Herausg. von Wernher und Leuckart). Giessen, 1865, p. 143. — Das Mikroskop und seine Anwendung, II. Braunschweig, 1869. p. 198.

2) Lehrbuch der Botanik. 4. Aufl. Leipzig, 1874. p. 120.

3) Vergl. Unters. p. 2—10 u. a.

4) Betracht. p. 17.

5) Schizaeaceae, p. 29.

6) Vergl. Unters. p. 9.

7) Vergl. Unters. p. 6.

8) Schizaeaceen p. 29.

9) l. c. p. 432

führende Zellen“ und De Bary¹⁾ spricht von „Gruppen oder Reihen von kleine Stärkekörner führenden Parenchymzellen“ die zwischen die Tracheiden gelagert sein können. Die Frage, ob die stärkeführenden Elemente untereinander in Verbindung stehen, ist nicht aufgeworfen worden. Es ist schon von vorn herein zu vermuthen, dass der bezeichnete Zusammenhang besteht, weil sonst eine Leitung der in ihnen vorhandenen Nährstoffe durch die Hydroiden hindurch nicht gut denkbar wäre, und es liegt um so näher, einen Zusammenhang der stärkeführenden Elemente untereinander anzunehmen, weil ein solcher zwischen den analogen, offenbar einzig in physiologischer Hinsicht mit ihnen vergleichbaren Elementen der Phanerogamen nach der ausführlichen erwähnten Untersuchung Troschel's immer vorhanden ist. Um jedoch die aufgeworfene Frage sicher zu entscheiden, habe ich drei ganz beliebig herausgegriffene Arten untersucht.

Ich fixirte auf dem Querschnitt eine einzelne allseitig von Hydroiden umgebene Stärkeparenchymzelle oder eine kleine Gruppe derselben und suchte nun durch successive Querschnitte zu entscheiden, ob diese Zellen nach unten und oben mit gleichnamigen oder ungleichnamigen Elementen verbunden seien, und ob die Zellen mit den anatomisch gleichartigen ausserhalb der Hydroiden (im „Phloëm“) befindlichen Elementen communicirten oder nicht. In allen Fällen konnte mit Leichtigkeit entschieden werden, dass bei den Filicineen die im Bau und Inhalt den Amylomzellen der Phanerogamen entsprechenden Elemente ebenfalls ein zusammenhängendes System bilden, und wir glauben daher berechtigt zu sein, dasselbe auch hier als Amylom zu bezeichnen.

Die concreten untersuchten Fälle sind die folgenden:

a. *Pteris aquilina* (Figur 2).

Im Rhizom von *Pteris aquilina* gehen nicht selten Amylomzellen von dem einen Rande der Hydroidenplatte bis zum anderen, und häufig wird eine einzelne Hydroide auf dem Querschnitt allseitig von Amylom umgeben, so dass die Hydroide nicht mit den anderen in Verbindung zu stehen scheint. In Figur 2 stellen A, B und C drei successive Querschnitte durch einen sehr kleinen Theil eines Rhizom-Bündels dar. Die gleichen Zellindividuen auf den verschiedenen Schnitten oder doch Zellen, die nur durch Querwände von einander getrennt waren, erhielten die gleiche Bezifferung (Hydroiden) resp. die gleichen Buchstaben (Amylomzellen). — Vergl. die Figuren-Erklärung. — Der Schnitt A zeigt isolirte, von Hydroiden umgebene Amylom-Elemente a, b, die in Schnitt B auf der einen und in C auch auf der anderen Seite mit Amylomelementen in Verbindung stehen. Der Amylomstreifen

1) l. c. p. 357.

c d e zwischen den Hydroiden 7 und 8 verbindet bei B die erst (A) isolirt erscheinenden Zellen a b mit dem „Phloëm“ f g. — Es ist, wie schon gesagt wurde, für unsere Betrachtung natürlich gleichgültig, ob die Zellen a b auf den drei Schnitten A, B und C dieselben Individuen darstellen, oder ob es, wie dies wahrscheinlich ist, verschiedene durch Querwände getrennte Zellen sind. Dasselbe gilt für die gleich bezifferten Hydroiden.

b. *Alsophila microphylla* (Figur 3).

Die hydrale Platte des Stamm-Bündels des genannten Farnbaumes wird auf Querschnitten nicht selten von den reichlich Plasma (und Stärke?) führenden Amylomzellen von dem einen Rande bis zum anderen durchkreuzt. Ganz von Hydroiden umgebene Amylom-Gruppen wie auf Schnitt A sind bei dieser Art gar nicht einmal häufig, sondern schon ein einziger Querschnitt macht den Eindruck, dass eine Verbindung zwischen allen Amylomzellen besteht. Die in Schnitt A allseitig von Hydroiden umgebene aus vier Zellen bestehende Amylom-Gruppe steht selbst oder eine nur durch Querwände getrennte andere Gruppe, wie der successive Querschnitt B zeigt, mit der Xylemscheide, die an die Hydroiden 1, 8, 7, 6 grenzt, durch gleichnamige Elemente in Verbindung. Auch in diesem Falle wurden die correspondirenden oder durch Querwände getrennten Hydroiden zur leichteren Orientirung mit denselben Zahlen versehen. — Vergl. die Figuren-Erklärung.

c. *Marattia laxa* (Figur 4).

Ich habe zum Nachweis des Zusammenhanges der Amylom-Elemente untereinander ausser den beiden angeführten beliebig gewählten Beispielen besonders desshalb eine *Marattiacee* untersucht, weil Russow¹⁾ erwähnt, dass die „Geleitzellen“ bei der besagten Familie, wenn sie überhaupt vorkommen, nur sehr spärlich vertreten sind, und es würde aus diesem Grunde hier noch am ehesten eine einzelne oder eine Gruppe isolirter Geleitzellen gefunden werden können, wenn dies überhaupt vorkäme.

Die Amylom-Zellen finden sich auf dem Querschnitt gewöhnlich in Gruppen von 2—12, allseitig von Hydroiden umgebenen Zellen, so dass es allerdings scheinen könnte, als ob sie in isolirten Nestern auftreten.

Successive Querschnitte, von welchen drei in Figur 4 abgebildet sind, ergaben jedoch mit Leichtigkeit das vermuthete Resultat. Die auf dem Schnitt A befindlichen, durch eine starke dunkle Contour gekennzeichneten, allseitig von Hydroiden umgebenen beiden Amylomgruppen, von welchen die eine zwei-, die andere dreizellig ist, stehen

1) Vergl. Unters. p. 105.

auf dem Querschnitt B durch unter diesen Gruppen befindliche gleichnamige Elemente untereinander und durch eine enge Amylom-Membran auch mit dem Phloëm in Communication. Bei C ist die Verbindung mit dem Phloëm noch augenfälliger. (Vergl. die Figuren-Erklärung).

Bei manchen Arten und für die Leitbündel in bestimmten Organtheilen, wie in der Basalpartie des Petiolus von *Nephrodium Thelypteris* z. B. erscheint ein besonderer Nachweis des Zusammenhanges der Amylom-Elemente desshalb unnöthig, weil dieselben hier zwischen den Hydroiden so reichlich vertreten sind, dass eher die Hydroiden in das Amylom eingesenkt erscheinen als umgekehrt.

Während die Hydromtheile des Bündels und, wie wir sehen werden, die specifischen Elemente des Siebtheils auf grossen Strecken von einander getrennt bleiben können, ohne mit einander zu communiciren, scheint eine solche Sonderung unter den Theilen des Amyloms kaum vorzukommen. Vielmehr scheint die Funktion des Amyloms eine Verbindung aller seiner Elemente untereinander zu fordern.

Im Bündel des Rhizoms von *Marsilia macra* u. a. habe ich hin und wieder nicht nur die innere und äussere Xylemscheide durch Brücken aus Amylomzellen schon auf einzelnen Querschnitten durch den Hydroiden-Cylinder hindurch communiciren sehen, sondern auch die Siebelemente werden von Amylomzügen durchbrochen, so dass das Amylom innerhalb und ausserhalb des Hydrom-Cylinders ein einziges System bildet. Die Amylom-Elemente des „Phloëms“ hängen untereinander wohl immer zusammen, und dies ist in den meisten Fällen so evident, dass ein besonderer ausführlicherer Nachweis, wie er für die zwischen den Hydroiden lagernden Elemente erwünscht war, nicht nöthig erscheint. Bei den untersuchten *Polypodiaceen*, z. B. *Polypodium glaucophyllum*, Figur 13, fand sich regelmässig in Rhizomen an den Polen des Hydromstranges eine Verbindung der Xylem- und Phloëm-Scheide, so dass eine zweiseitig symmetrische Lagerung zu Stande kommt.

Da die Amylom-Elemente die Aufgabe haben ihre Inhaltsproducte zu leiten, so ist es zweckmässig, wenn sie in der Leitungsrichtung längsgestreckt sind. In der That verhalten sich in dieser Hinsicht die Gefässkryptogamen wie die Phanerogamen. Die Leitung wird im Grossen und Ganzen, vorzugsweise in der Längsrichtung des Leitbündels stattfinden, und in dieser Richtung sind auch die Zellen gestreckt; dort aber, wo die Amylomzellen eine radiale Verbindung zwischen gleichnamigen Elementen herstellen, sind sie auch, wie es nach dem Gesagten verlangt werden muss, radial gestreckt. Besonders auffallend ist dies bei *Botrychium rutaefolium*, bei welcher Art nach Russow¹⁾ der Hydroiden-Cylinder durch Markstrahlen unterbrochen

1) Vergl. Unters. p. 119, Tafel VII, Fig. 157.

erscheint, deren in tangentialer Richtung sehr schmale Zellen stark radial gestreckt sind.

Bezüglich der Tüpfel-Stellung der Amylomzellen verhält es sich auch hier wie bei den Phanerogamen, woselbst Tüpfel vornehmlich diejenigen Membranen bekleiden, welche zur Leitungsrichtung senkrecht stehen¹⁾. Wenigstens wurde dies, wie wir sahen, so constatirt, wo überhaupt Tüpfel reichlicher vorkommen wie im Mark-Cylinder der *Schizaeaceen*.

4.

Das Hydrom und ein Theil des Amyloms jedes Leitbündels bilden zusammengenommen ein System höherer Ordnung, für welches Haberlandt²⁾, wie wir bereits früher erwähnten, den Namen **Hadrom** eingeführt hat.

Es sind zunächst die anatomischen Thatsachen, die für eine solche physiologische Zusammengehörigkeit der beiden Systeme des Hydroms und des Amyloms sprechen: fast überall suchen die Amylom-Elemente die Hydroiden auf; aber zu einer ganz klaren Einsicht, in welcher physiologischen Wechselbeziehung beide Systeme zu einander stehen, sind wir bislang doch noch nicht gekommen. Auf Grund der bereits erwähnten Untersuchungen von Volkens und nach einer neueren Darstellung, die P. Schulz³⁾ über die Beziehung der Markstrahlen zu den Gefässen geliefert hat, muss man annehmen, dass die Amylomzellen vermöge der osmotischen Kräfte, die in ihrem Inhalt wirksam sind, das Wasser aus den Gefässen schöpfen, wenn die Gewebe des Wassers bedürfen, wie dies namentlich am Tage bei reichlicherer Verdunstung der Fall ist. Die Amylom-Elemente füllen jedoch die Gefässe auch wieder; dies findet vorzugsweise nachts statt, wenn der Verbrauch durch Verdunstung geringer ist oder gänzlich aufhört; die Gefässe speichern alsdann das Wasser für den Tag in sich auf.

Es würde sich hieraus auch die Zweckmässigkeit erklären, dass dort, wo zahlreiche Hydroiden neben einander liegen, regelmässig Amylom-Elemente zwischen denselben eingelagert sich finden. Wenn auch nicht zu leugnen ist, dass, wie De Bary⁴⁾ angiebt, das Vorkommen oder Fehlen von Stärke führenden Parenchymzellen zwischen den Hydroiden zum Theil „nach Species, vielleicht auch Genera“ verschieden ist, so zeigt sich doch noch unzweifelhafter das eben erwähnte Verhalten. Nach Russow⁵⁾ ist z. B. in den Wurzeln der *Polypodia-*

1) Troschel, l. c. p. 81—82.

2) l. c. p. 5—6.

3) Das Markstrahlengewebe und seine Beziehung zu den leitenden Elementen des Holzes. In dem vorliegenden Bande dieses Jahrbuches, N. IV.

4) l. c. p. 357.

5) Vergl. Unters. p. 103.

ceen, „wo der axile Strang einen bedeutenden Querdurchmesser erlangt, wie bei *Diplazium* und *Blechnum brasiliense*, der Xylemkörper von Geleitzellen durchsetzt.“ Auch De Bary¹⁾ selbst citirt als Beispiele für die Einlagerung ungleichnamiger Elemente zwischen die Hydroiden Fälle mit „relativ dickem cylindrischem Gefässstheil der Rhizome“.

Bei *Marattia laxa* fand ich eine stärkere Hydroiden-Masse in den Bündeltheilen des Blattpolsters als in den Theilen der Bündel, welche durch den Blattstiel laufen. Während auf dem Querschnitt durch den Stiel nur 2—5 Hydroiden in den Bündeln nebeneinander liegen, ohne „Geleitzellen“ zwischen sich, vermehren sich im Gelenkpolster die Hydroiden derart, dass hier 4—8 Zellen in der Querrichtung zu zählen sind, und hier nehmen sie denn auch Amylom-Elemente zwischen sich auf, die in den anderen Bündeltheilen regelmässig fehlen. Bei ein und derselben Art kann also in den verschiedenen Organtheilen, je nachdem mehr oder weniger Hydroiden in deren Bündeln nebeneinander auftreten, das hydrale System vom Amylom durchsetzt werden oder nicht. Bei einem als *Polypodium harpeodes* (*P. loriceum*) im Kgl. botanischen Garten bezeichneten Farn verlaufen im basalen Theil des Petiolus mehrere Bündel, die sich nach oben in ein grosses Bündel vereinigen. Während nun die unteren kleineren Bündel auch nur ein kleines Hydrom ohne zwischengelagerte Stärkezellen aufweisen, besitzt das grosse Bündel oben zwischen den Hydroiden Amylom. Es ist also zwischen den beiden möglichen Fällen keineswegs eine Grenze zu ziehen. *Polypodium vulgare* besitzt gewöhnlich im Rhizom ein einfaches nur von Amylom umgebenes Hydrom; sobald aber die Bündel grösser sind, finden sich, wie bei *Polypodium glaucophyllum*, Figur 13, zwischen den Hydroiden Amylom-Elemente. — Dergleichen Beispiele könnten bedeutend vermehrt werden.

Die Hydroiden-Masse wird immer von mindestens einer Amylom-Lage (Xylemscheide) unmittelbar umgeben, wie auch Figur 13 zeigt, so dass, wenn wir diese Schicht und die Hydroiden mit ihren etwaigen Amylom-Elementen zusammenfassen, gesagt werden kann, das sämmtlichen Gefässkryptogamen Hadrom zukommt.

Selten liegen den Hydroiden unmittelbar Siebröhren an, wie z. B. nach Russow²⁾ in den Wurzeln der *Marsiliaceen*, aber in allen Fällen treten dann auch ausserdem Amylom-Elemente in überwiegender Anzahl neben den Hydroiden auf.

5.

Leptom nennt Haberlandt³⁾ „den eiweissleitenden Theil des Mestoms, also dasjenige, was man bisher „Weichbast“ nannte, — Sieb-

1) l. c. p. 357.

2) Vergl. Unt. Fig. 17 auf Tafel II.

3) Entw.-Gesch. d. mech. Gew. p. 5.

röhren und Cambiform --.“ Wie man sich die Leitung der Protein-Verbindungen jetzt vorzustellen hat, nachdem Janczewski¹⁾ zeigte, dass die Siebporen bei den Farnkräutern nicht, wie man vermuthete, perforirt sind, bleibt dahin gestellt. Das Leptom dient gewiss daneben noch als Reservoir der Eiweiss-Verbindungen.

Während, soweit ich die Sache beurtheilen kann, verallgemeinert werden durfte, dass die sämtlichen Amylomzellen des Bündels immer mit einander communiciren, steht es mit dem Leptom, wo es in mehreren Gruppen auftritt, anders (Figur 13). Wenn die letzteren auch schliesslich an irgend welchen Stellen sicherlich ebenfalls zusammenhängen, so ist das Verhältniss doch ein ganz verschiedenes. Die Leptom-Stränge bilden nicht ein körperliches Gitterwerk wie das Amylom. Auf grossen Strecken ziehen sie nebeneinander hin, ohne dass sie durch gleichnamige Elemente verbunden würden. In seltenen Fällen kommt allerdings einmal eine Berührung sonst getrennter Leptom-Stränge zu Stande, wie in den bicollateralen Stammbüdeln der *Polypodiaceen*; allein man gewinnt den Eindruck, dass diese gelegentlichen Verbindungen nicht durch die Funktion der Siebtheile gefordert werden, weil dieselben nicht Regel sind, wie bei den Amylom-Elementen.

Das Leptom besteht bei den Filicineen aus Siebröhren und stärkelosen, aber viel Eiweiss führenden, gestreckt parenchymatischen Zellen, die man nach der oben gegebenen Definition Haberlandt's als das Cambiform des Leptoms bezeichnen müsste. Allein, da das Wort Cambiform ursprünglich von Nägeli²⁾ in anderem Sinne gebraucht wurde, den die späteren Autoren nicht beibehielten, und da Haberlandt³⁾ selber schliesslich entgegen seiner Definition den Ausdruck Cambiform auch für die Stärke führenden Amylomzellen der Farnkräuter anwandte — vielleicht weil Schwendener⁴⁾ die in Rede stehenden Zellen früher ebenso genannt hatte —, so empfiehlt es sich ausdrücklich zu bemerken, dass an dieser Stelle im Anschluss an Sachs⁵⁾ und De Bary⁶⁾ als Cambiform nur die Eiweiss enthaltenden, gestreckten, wie es scheint stets porenlosen, die Siebröhren begleitenden Leptomzellen bezeichnet werden sollen. In welcher Verbreitung bei den Farnkräutern ein solches Cambiform vorkommt, ist noch nicht festgestellt worden. Dies Gewebe scheint häufig die Siebröhren zu begleiten und sehr wahrscheinlich müssen hierhin die auf dem Querschnitt

1) l. c. p. 226 (18), 255 (47).

2) Beiträge zur wiss. Botanik I, Leipzig 1858, p. 4.

3) Ueber collaterale Gefässbüdnel im Laube der Farne. (Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss. in Wien. Math.-naturw. Classe. LXXXIV. Bd., I. und II. Heft, Juni und Juli 1881). p. 129.

4) Mech. Pr. p. 162.

5) l. c. p. 121.

6) l. c. p. 336—339.

durch ihre Kleinheit von den Siebröhren wohl zu unterscheidenden Leptom-Elemente vieler Farnkräuter gerechnet werden. Es scheint sogar zuweilen das Cambiform die Siebröhren überhaupt zu vertreten. De Bary¹⁾ wenigstens sagt: „Bei den kleineren *Lycopodien*, den *Selaginellen*, bei sehr vielen Filices mit kleinen und aus engen Elementen zusammengesetzten Gefässbündeln (*Polypodium vulgare*) werden die Orte, wo sich die Siebröhren bei den bisher besprochenen Formen befinden, eingenommen von Elementen der gleichen Gestalt, Inhalts- und allgemeiner Wandbeschaffenheit, aber ohne deutliche Siebfelder oder Siebporen. Ob letztere wirklich fehlen, . . . ist für diese Fälle, auch für die *Lycopodien*, noch genauer zu untersuchen.“

Nach Janczewski²⁾ besteht das Leptom von *Polypodium vulgare* aus Siebröhren, denen parenchymatische Zellen beigemischt sind, welche das Cambiform darzustellen scheinen.

Sachs³⁾ giebt in den Leitbündeln der Blattflächen von *Botrychium Lunaria* eine Cambiformlage an, welche dem centralen Hydroiden-Strang unmittelbar anliegt; ich vermuthe, dass hier Amylom gemeint ist.

Bei der Betrachtung des Bündelbaues bei den einzelnen Familien wird noch Näheres über das Cambiform mitgetheilt werden.

Das von Russow⁴⁾ Protophloëm genannte Gewebe, welches sich zuerst aus dem Procambium aussondert, glaube ich zum Leptom rechnen zu dürfen (Protoleptom).

Dippel⁵⁾ meint bekanntlich, dass die Zellen dieses Gewebes wohl als echte Bastfasern anzusprechen seien, da „sie auf dem Längsschnitt die ganz entschiedene Faserform“ zeigen. Die Zellen führen nach diesem Autor in den ersten Wachstumsperioden einen flüssigen Inhalt, später nur Saft, zu keiner Zeit aber Stärke.

Trotzdem Russow⁶⁾ sagt, dass er bemüht sein werde, „den Nachweis zu liefern, dass die Protophloënzellen den Siebröhren nächst verwandte und von den echten Bastzellen in jeder Beziehung verschiedene Gebilde sind,“ so spricht er doch in einer späteren Arbeit⁷⁾ nicht-destoweniger die Vermuthung aus, dass im jungen Leitbündel das Protophloëm eine lokalmekanische Bedeutung zu haben scheine. In derselben Schrift⁸⁾ sagt er nochmals, dass die Protophloënzellen „stets dem Weichbast, Cambiform angehören und entweder die ersten Bast-

1) l. c. p. 190.

2) l. c. p. 218.

3) Lehrbuch p. 410.

4) Vergl. Unt. p. 4, 17, 18, 163.

5) Zusamm. d. Gefässb. p. 144.

6) Vergl. Unt. p. 4, 17, 18, 163.

7) Betr. p. 25.

8) Betr. p. 24; vergl. auch p. 19.

röhren oder Bastgefässe, mit oder häufiger ohne Gittertupfelung darstellen, von den sog. Bastfasern, mit denen sie bisher fast allgemein verwechselt wurden, durchaus verschieden.“

M. Treub¹⁾ glaubt, dass man die Protophloënzellen von *Selaginella Martensii* fast zu den Siebröhren rechnen darf.

Während De Bary²⁾ in dem Abschnitt seiner Vergl. Anatomie, der über den collateralen Bau der Bündel handelt, angiebt, dass in den genauer untersuchten zugänglichen Fällen die Protophloë-Elemente sich theils als Siebröhren, theils als Cambiformzellen herausgestellt haben, lässt es dieser Anatom bei der Betrachtung der concentrischen Bündel, die er den meisten Filicineen zuschreibt, dahingestellt³⁾, ob sie den Siebröhren zuzuzählen oder als eigenartige Organe anzusehen sind.

Prantl sagt nichts über die Zugehörigkeit des in Rede stehenden Gewebes; er giebt nur als Bau der Protophloë-Elemente der *Schizaeaceen* eine stark quellungsfähige Membran an mit regellos vertheilten einfachen runden Tüpfeln.⁴⁾

Janczewski⁵⁾ endlich hat das Protophloëm von *Pteris aquilina* untersucht. Er beschreibt die Zellen als sehr lang und spindelförmig mit stark verdickten, durchaus glatten Membranen. Der Inhalt ist ohne Stärke, aber mit einem elliptischen oder abgerundeten Kern versehen. Nach diesem Autor hat das Protophloëm von *Pteris* nichts gemeinsam mit den primären Siebröhren.

Um mir ein eigenes Urtheil über den Bau des Protophloëms zu bilden, habe ich ein sehr günstiges Object aus dem Kgl. botanischen Garten hierselbst, nämlich die verhältnissmässig sehr grossen Protophloë-Elemente im Blattstiel von *Dicksonia antarctica* untersuchen können. Wie die Figur 5 veranschaulicht, welche ein Stück einer Protophloënzelle in der Längsansicht zeigt, ist hier der Bau vollständig übereinstimmend mit demjenigen der Siebröhren. Die Wände zeigen Siebplatten mit den daran haftenden charakteristischen Körnchen. Auch in Figur 12 C liegen zwei Stücke zweier Siebröhren nebeneinander. In Figur 9 ist das Protophloëm auf dem Querschnitt dargestellt.

Durch den übereinstimmenden Eindruck, den das Protophloëm auf Querschnitten bei allen übrigen Gefässkryptogamen macht, und wegen der Lagerung dieses Gewebes und seines überall gleichen entwicklungsgeschichtlichen Auftretens werden wir zu dem Analogie-Schluss genöthigt, dass auch in diesen Fällen das Protophloëm zum Leptom zu rechnen ist. Allerdings müsste noch durch weitere Untersuchungen die

1) Recherches sur les organes de la végétation du Sel. Mart. Leide, 1877, p. 10.

2) Vergl. Anat. p. 338.

3) l. c. p. 358.

4) Schiz. p. 28.

5) l. c. p. 221—222 (13—14).

Berechtigung dieser Verallgemeinerung geprüft werden, schon aus dem Grunde, weil die Genesis von Organen, welche dieselbe Funktion haben, bekanntlich keineswegs dieselbe zu sein braucht. Nach dem Gesagten würde es sich empfehlen das Protophloëm als Protopleptom zu bezeichnen. — Das Protoxylem könnte passend Protohydrom genannt werden.

6.

Aus neuen Untersuchungen von Schwendener¹⁾ geht hervor, dass die **Caspari'sche Schutzscheide**, oder **Endodermis** in erster Linie eine mechanische Bedeutung hat, um vermöge ihrer, durch die Verkorkung bedingten, sehr geringen Dehnbarkeit besonders die Einflüsse der Differenzen des Turgors zwischen Grundparenchym und Bündelgewebe unschädlich zu machen. Die Skeletbelege der Bündel sind eine mechanische Verstärkung der auch als „innere Häute“ durch ihre relative Undurchlässigkeit fungirenden Schutzscheiden.

Die Besprechung der Schutzscheiden wäre wegen ihrer Funktion besser auf diejenige des Skelet-Gewebes gefolgt. Allein die Arbeit Schwendener's erschien erst im letzten Augenblick, nach vollständiger Fertigstellung des Manuskriptes.

Nur den *Marattiaceen* und den *Selaginellen* fehlt dieses Organ²⁾, aber auch diese Familien besitzen es in der Wurzel, der es überhaupt niemals fehlt.

Zur Genesis der Endodermis.

Manche botanischen Autoren haben besonderes Gewicht darauf gelegt, ob die Schutzscheide aus dem „Grundgewebe“ oder aus dem Procambium hervorgeht, weil dies das Criterium für dieselben dahin abgibt, ob die Endodermis zum Bündel zu rechnen ist oder nicht. Da bei den Phanerogamen-Wurzeln die Schutzscheide unzweifelhaft nachträglich aus dem Grundparenchym hervorgeht, wurde dies von Russow verallgemeinert, und er nahm daher auch in seinen vergleichenden Untersuchungen an, dass bei den Farnkräutern die Scheide ein Produkt des Grundgewebes sei. Er fand jedoch ausserdem³⁾, dass auch die peripherische Amylomlage der Leitbündel, seine Phloëmscheide, bis zum Protopleptom exclusive aus gemeinsamen Mutterzellen mit der Schutzscheide hervorgeht, und er sah sich nun durch seinen Standpunkt genöthigt, die Grenze des Bündels beim Protopleptom anzunehmen. Bei dieser Definition fehlt ein Ausdruck für die Einheit hoher Ordnung, welche wir im Eingang als Bündel bezeichnet haben und die unzweifel-

1) Die Schutzscheiden und ihre Verstärkungen. In den Abbandl. d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1882.

2) De Bary, l. c. p. 359.

3) Vergl. Unt. p. 195—198.

haft physiologisch zusammengehört. Durch die Russow'sche Begriffsbestimmung durfte nur der eine Theil des Amyloms zum Leitbündel gerechnet werden. Dass dies eine im höchsten Grade unpraktische Bezeichnungsweise ist, wird im Allgemeinen schwerlich gelegnet werden können.

De Bary¹⁾ meint im Gegentheil auf Grund der erwähnten entwicklungsgeschichtlichen Beziehung zwischen Endodermis und Phloëmscheide, dass dieselbe für die Endodermis der meisten Bündel in Farnstämmen eher zu dem Resultat führe, dass die Endodermis aus dem Procambium des Bündels hervorgeht, und Prantl²⁾ möchte bei den *Hymenophyllaceen* und *Schizaeaceen* die Endodermis ebenfalls dem Bündel zuweisen, weil sie in zahlreichen Fällen unzweifelhaft mit der Phloëmscheide des Stranges gleichen Ursprungs sei, und die Phloëmscheide in nichts von dem übrigen Amylom-Parenchym differire. Bei *Aneimia* und *Mohria* besteht nach Prantl keine Veranlassung einen genetischen Zusammenhang der Endodermis mit dem Grundgewebe anzunehmen.

Meine eigenen Untersuchungen über diesen Gegenstand haben zu dem folgenden Ergebniss geführt.

Querschnitte durch ganz jugendliche Sprossgipfel und Blattstiele machten immer den Eindruck, als ob das betreffende Organ aus drei, oder, wenn man das Epidermis-Histogen mitrechnet, aus vier besonderen Histogenen bestände und zwar ausser der Epidermis aus einem Grundparenchym und aus einem das Bündel-Procambium umgebenden Folge-Meristem, dem Coleogen Haberlandt's³⁾. Radiale Zellreihen, wie sie Russow's Querschnittsfiguren 183 und 185 in seinen Vergleichen den Untersuchungen zeigen, in welchen die radialen Längswände des Grundparenchyms mit radialen Wänden des Scheiden-Histogens regelmässig zusammentreffen, habe ich in der gleichen ausgesprochenen Weise nicht gefunden.

Untersucht habe ich Blattstiele von *Aspidium violascens*, *Dicksonia antarctica*, *Lygodium japonicum*, *Polypodium vulgare*, *Pteris aquilina* und *Pt. tremula*, sowie Rhizomspitzen von *Hymenophyllum*, *Polypodium pustulatum*, *P. vulgare* u. a. Wie die Figuren 6 bis 11 zeigen, gehen die radial vor einander liegenden Zellen des Scheiden-Gewebes bis zum Protoleptom aus je einer einzigen Mutterzelle durch Tangentialtheilungen hervor, so dass häufig die Radialwände von drei, zuweilen auch vier und mehr (Figuren 6, 8, 9) in der gleichen radialen Richtung liegenden Zellen zusammentreffen. In den Blattstielen findet durch schnelles Wachsthum bald eine Verschiebung der Wände statt, so dass die Entstehungsweise dann nicht mehr aus der Richtung der Wand-

1) l. c. p. 330.

2) Hymenop. p. 18. Schiz. p. 30.

3) Entw.-Gesch. d. mech. Gew.

linien erschlossen werden kann. In Rhizomen, die im allgemeinen verhältnissmässig weit langsamer wachsen, bleibt daher auch, namentlich bei den *Polypodiaceen* (Figur 13), die radiale Anordnung häufig erhalten.

Bei *Hymenophyllum nitens* waren die genetischen Wandlinien noch im vollständig entwickelten Rhizom so deutlich geblieben, dass schon hieraus der gemeinsame Ursprung der Schutzscheide und der aus mehreren Zellschichten bestehenden Amylomlage bis zum Protoleptom unzweifelhaft hervorging.

Auf Längsschnitten habe ich nur bei einer Art mit verhältnissmässig grossen Zellen, *Dicksonia antarctica* (Figur 12), ein befriedigendes Resultat zu erhalten vermocht. Das Grundparenchym Gr ist an den vom Procambium entfernteren Stellen wegen des intensiven Längenwachstums weniger hoch als breit, sonst ist es isodiametrisch und die Zellen der dem Bündel unmittelbar angrenzenden Schicht sind sogar länger als breit und häufig (Figur 12 C) auch kleiner als die übrigen Grundparenchymzellen. Es ist also ein allmählicher Uebergang vom ausgesprochenen Grundparenchym zum Procambium vorhanden. — Im Uebrigen sind die Figuren und ihre Erklärungen zu vergleichen.

Die gleiche Entwicklung der genannten Scheidengewebe hat Haberlandt¹⁾ in den Farnblättern gefunden. Nach diesem Autor entstehen die Schutz- und Phloëmscheide aus einem „grundparenchymatischen Coleogen“. Bei den *Osmundaceen* und *Marattiaceen* entstehen die beiden mehr oder weniger regelmässig ausgebildeten Parenchymscheiden der Laubbündel ebenfalls aus einem Coleogen²⁾, und bei *Osmunda regalis* ist die erwähnte Parenchymscheide in den Bündeln der Fiederblättchen zum Theil cambialen Ursprungs.

Es ist bemerkenswerth, dass bei den bicollateralen, irrthümlich zu den concentrischen gerechneten Rhizom-Bündeln mancher *Polypodiaceen*, das Scheiden-Folgeraster unmittelbar an das Protohydrom grenzt, welches letztere in diesen Fällen an zwei polaren peripherischen Punkten des Procambiums sich entwickelt. Untersucht wurden in dieser Hinsicht *Polypodium pustulatum*, Figur 11 und *P. vulgare*, Figur 10. Bei diesen beiden Arten wird die äusserste Peripherie des Procambiums von zwei zuweilen unterbrochenen, sichelförmigen, sich gegenüberstehenden Protoleptom-Gruppen eingenommen, die mit zwei die übrige Peripherie des Procambiums einnehmenden kleinen Protohydromsträngen abwechseln, welche entweder unmittelbar an das Protoleptom stossen (Figur 10 B und 11) oder durch Procambiumzellen von denselben getrennt werden (Figur 10 A). Das Centrum eines solchen

1) Coll. Gefässb. p. 130.

2) Haberlandt, collaterale Gefässbündel. p. 132—133.

jugendlichen Leitbündels wird also von Procambium, die Peripherie von dem Scheiden-Folgemeristem eingenommen, und zwischen diesen beiden befinden sich Protoleptom- resp. Protohydrom-Elemente. In den Blattstielen von *Polypodium vulgare* jedoch habe ich den alleinigen Protohydromstrang der kleineren Bündel nicht an das Coleogen grenzend gefunden. In Figur 13, welche ein fertig entwickeltes Rhizom-Bündel von *Polypodium glaucophyllum* darstellt, ist namentlich bei Ph Ph noch ganz deutlich aus der Richtung der genetischen Wandlinien wahrzunehmen, dass das Coleogen unmittelbar an das Protohydrom angrenzte.

Im Stamme (*Lycopodium annotinum*) sind, wie es scheint, die drei bis vier Zellschichten, welche dem Stereommantel innen unmittelbar anliegen, ebenfalls gemeinsamen Ursprungs in dem dargestellten Sinne. Mein Material genügte jedoch nicht, diese Frage mit Bestimmtheit zu entscheiden.

7.

Ein mit dem **Cambium** der Phanerogamen vergleichbares Gewebe wurde bisher nur von Russow¹⁾ bei *Botrychium rutæfolium* gefunden. Der durch meist einreihige Markstrahlen durchbrochene Hydroidencylinder wird von einem Cambium umgeben, welches seinerseits von einer mit den Markstrahlen durch das Cambium hindurch communicirenden Amylomschicht umschlossen wird. Dann folgt nach aussen Leptom, dann nochmals eine Amylomschicht und endlich die Schutzscheide. Das Centrum wird von einem mit den Markstrahlen verbundenen Mark eingenommen.

8.

Ein besonderes Gewebe, dessen Bedeutung noch ganz unklar ist, bildet das **Lückenparenchym** Russow's²⁾ vor dem Protohydrom in den einspringenden Winkeln gebogener Hydroiden-Platten in den Blattstielen mancher Farne. Die Zellen dieses Gewebes besitzen ein weiteres Lumen als die übrigen Bündel-Parenchymzellen und ihre Wände sind derart unregelmässig aus- und eingebuchtet, dass grosse Intercellularen zu Stande kommen. Es findet sich z. B. in dem Blattstiel von *Dicksonia antarctica*, *Blechnum Spicant*, *Asplenium angustifolium* u. s. w.

Terminologische Schemata für die Begriffe Xylem und Phloëm.

Wenn wir von allen Ausnahmen absehen, so gelten nach der jetzt

1) Vergl. Unt. p. 119, Tafel VII, Fig. 157.

2) Vergl. Unt. p. 101.

allgemein üblichen Nomenclatur folgende terminologische Schemata für die Begriffe Xylem und Phloëm:

a. Gefässkryptogamen.

Xylem	{ Hydrom Amylom }	Hadrom	} Mestom.
Phloëm	{ Siebröhren (Protoleptom) Cambiform Endodermis }	Leptom	
Stereom (Sklerenchymscheiden und Belege).			

b. Gefässkryptogamen nach Russow.

Phloëm	{ Siebröhren (Protoleptom) Cambiform }	Leptom	} Mestom
Xylem	{ Hydrom Amylom }	Hadrom	}
Grundgewebe	{ Endodermis Stereomscheiden und Belege.		

Der eine Theil des Amyloms gehört also hiernach zum Xylem, nämlich die Geleitzellen und die Xylemscheide, der andere Theil, nämlich die Phloëmscheide, zum Grundgewebe.

c. Die nicht in die Dicke wachsenden Phanerogamen.

Xylem	{ Hydrom Amylom }	Hadrom	} Mestom
Phloëm	{ Siebröhren Cambiform }	Leptom	
Grundgewebe { Stereom (Strangscheiden).			

d. Die in die Dicke wachsenden Phanerogamen.

		Stereom		Mestom		
Xylem	{	Libriform				
			Hydrom			
			Holzparenchym	}	Amylom	}
	Markstrahlen					
Phloëm	{		Siebröhren	}	Leptom	
			Cambiform			
			Echter Bast			

IV. Anordnung der Gewebe-Systeme der Leitbündel bei den einzelnen Gefässkryptogamen - Familien.

Die Aufgabe des Folgenden ist, die Anordnung der Systeme bei den verschiedenen Farn-Gruppen in den allgemeinsten Zügen darzulegen.

A. Allgemeines.

Wenn die Leitbündel Skeletgewebe besitzen, so umgiebt dasselbe mit seltenen unten genannten Ausnahmen die Bündel zu äusserst, und wir haben dann Stereo-Mestom-Bündel. Die centrale Partie besteht daher fast immer allein aus Gewebe, welches ernährungs-physiologischen Zwecken dient, also aus Mestom. In den meisten Fällen haben die Skelet-Theile einzig lokal-mechanische Bedeutung zum Schutz der Bündel wie bei den *Polypodiaceen*, in anderen Fällen, wenn z. B. gleichzeitig die Bündel peripherisch angeordnet sind, wie bei den Baumfarn, den *Cyatheaceen*, stellen sie zugleich das biegungsfeste Gerüst des Stammes dar. Das Gewebe der Blattstiele mancher *Hymenophyllaceen* besteht ausschliesslich aus einem centralen Mestomstrang, aus Stereom und einer Epidermis; auch hier schützt das mechanische Gewebe nicht ausschliesslich das Mestombündel, sondern ist gleichzeitig das biegungsfeste Gerüst des Blattstieles. Den Elementen des Mestoms zwischengelagert kommen Stereiden, die sich im Xylem und Phloëm bei den in die Dicke wachsenden Phanerogamen regelmässig vorfinden, nur bei gewissen *Schizaeaceen*, dann bei *Psilotum* und *Tmesipteris* und bei *Adiantum trapeziforme* und vielleicht anderen *Adiantum*-Arten vor.

Die Xylem-Partie des Leitbündels besteht immer aus einem Hadrom (Hydrom mit Amylom), im Centrum, namentlich wenn die Hydroiden weniger zahlreich sind, aus einem einfachen Hydromstrang, oder dem letzteren sind ausserdem Amylom-Elemente zwischengelagert. Dieses Hadrom wird entweder nur auf einer Seite von Leptom begleitet, so dass collaterale Bündel zu Stande kommen wie in den schwächeren Blattbündeln, oder aber die Bündel besitzen auf 2 gegenüberliegenden Seiten Leptomstränge, und das Ganze wird von Amylom umschlossen, und wir erhalten in dieser Weise bicollaterale Bündel, wodurch die meisten Wurzeln und z. B. auch die Stämme der *Polypodiaceen* ausgezeichnet sind. Echt concentrische Bündel, d. h. Leitbündel, welche durch sämtliche Ebenen, die sich durch die Achse legen lassen, in zwei symmetrische Hälften getheilt werden, finden sich z. B. in den Rhizomen der *Marsiliaceen*.

Umgeben wird das Hadrom von einem Amylo-Leptom.

a. Bau der Wurzel-Bündel.

Wie bemerkt, ist der Bündelbau der Wurzeln im Wesentlichen

überall derselbe, und wir geben daher gleich hier eine kurze Notiz über ihre Zusammensetzung, um nicht immer wieder dasselbe bei jeder einzelnen Gruppe wiederholen zu müssen.

Der gewöhnlich centrale Hydromstrang der Wurzel-Leitbündel ist meist diarch, bei manchen Arten¹⁾ triarch, bei anderen tetrach und bei den untersuchten *Hymenophyllum*-Arten meist tri- bis octarch. „In seltensten Fällen, wo der axile Strang einen bedeutenden Querdurchmesser erlangt, wie bei *Diplazium* und *Blechnum brasiliense*,“ ist nach Russow²⁾ der Hydroidenstrang von Amylomzellen durchsetzt.

Mit den Hydroidenarmen wechseln Leptom-Partieen ab, die gewöhnlich von denselben durch Amylomlagen getrennt sind, und die nach aussen ebenfalls von Amylom umzogen werden. Bei *Ophioglossum vulgatum* liegt nach Russow³⁾ das Protoleptom unmittelbar der Schutzscheide an, und bei *Marsilia* grenzt je eine einzelne Siebröhre an vier verschiedenen Stellen unmittelbar an die Hydroiden. Die Pole der Hydroidenplatten werden gewöhnlich von Amylom umzogen; die diarchen Wurzel-Bündel sind daher bicollateral gebaut. Das ganze Mestombündel ist in allen Fällen von einer Endodermis umgeben. Collaterale Anordnung kommt nach De Bary⁴⁾ bei *Selaginellen*, *Lycopodien*, *Isoëtes* und *Ophioglossum* vor.

Die *Marattiaceen*-Wurzel-Leitbündel sind nach der Abbildung Ph. van Tieghem's⁵⁾ nach dem gewöhnlichen Phanerogamen-Typus konstruiert. Sie besitzen nämlich kreisförmig um ein centrales Mark angeordnete mit einander abwechselnde Leptom- und Hydrom-Bündel. Nach Russow⁶⁾ sind die Hydroiden in den unterirdischen Wurzeln bis zum Centrum ausgebildet und bilden einen fünfstrahligen Stern.

Die beiden beschriebenen Typen sind mit einander verbunden, denn der *Marattiaceen*-Bau, jedoch nur mit zwei Hydrom- und zwei Leptom-Theilen, die mit einander abwechseln, kommt zu Stande, wenn bei den diarchen Bündeln die beiden Leptom-Bündel derart durch Amylomelemente verbunden werden, dass die Hydromplatte im Centrum durchschnitten wird, wodurch ein kleines Mark entsteht. Dieser Fall findet sich nach van Tieghem⁷⁾ bei *Nephrodium Thelypteris* und *Botrychium Lunaria*. Bei *Botrychium rutaefolium* fand ich drei Hydromstränge, die mit drei Leptom-Bündeln alternirten. Die einzel-

1) De Bary, Vergl. Anat. p. 377.

2) Vergl. Unters. p. 103.

3) V. U. Ophiogloss. p. 122. Mars. p. 19 mit Figur 17 auf Tafel II.

4) Vergl. Anat. p. 379.

5) Recherches sur la symétrie de structure des plantes vasculaires (Annales des sciences naturelles, Paris, 1870–71. XIII de la 5. Série.) Tafel 4, Figur 11.

6) V. U. p. 106.

7) l. c. Tafel V, Figur 18 und 27.

nen Stränge wurden von einander durch Amylom getrennt, welches auch innerhalb der Endodermis das ganze Bündel umgab.

Die Nebenwurzeln entspringen nach C. Nägeli und H. Leitgeb¹⁾ „aus Zellen der innersten an den Cambium-Cylinder anstossenden Rindenschicht“.

Oben ist das Parenchym der Wurzelbündel Amylom genannt worden, weil ich in demselben in den untersuchten Fällen (*Nephrodium Thelypteris*, *Osmunda regalis*, *Polypodium vulgare*, *Struthiopteris germanica* u. a.) Stärke fand.

Das Wurzel-Amylom ist identisch mit den „cellules conjonctives“ von van Tieghem, der jedoch immer nur hyalinen oder transparenten Inhalt angiebt.²⁾

Diejenigen Arten, welche im Petiolus und Stamm kein Stereom entwickeln, entbehren desselben nach Russow³⁾ auch in der Wurzel. Jedoch besitzen sonst die Wurzel-Bündel häufig mechanische Schutzvorrichtungen in Form von Skelet-Cylindern oder Skeletsträngen, welche ausserhalb der Endodermis die Bündel begleiten, und die aus 1—3 und mehr Zelllagen bestehen. Nach Russow⁴⁾ finden sich solche Skelettheile bei *Hymenophyllum*-Arten und mehreren *Polypodiaceen*, sowie bei *Marsilia* und *Schizaea*. Bei *Polypodium Platycerium*⁵⁾ und nach van Tieghem⁶⁾ auch bei *Polypodium irioides* ist an zwei gegenüberliegenden Stellen, an den Hydroidenpolen, wo die Nebenwurzeln entspringen, der Skeletcylinder unterbrochen.

b. Der Bau der schwächeren Blattbündel

ist nach Haberlandt⁷⁾ übereinstimmend collateral bei allen Gruppen, so dass auch auf die Blattbündel im Folgenden bei der Betrachtung der einzelnen Familien nicht eingegangen werden soll. Zudem handelt es sich bei der Betrachtung des Bündelbaues bei den verschiedenen Gruppen nicht um eine auf Vollständigkeit Anspruch machende beschreibende Anatomie der Bündel, sondern nur um eine Darstellung in den allgemeinsten Zügen der gegenseitigen Lagerung der physiologisch-anatomisch zu unterscheidenden Gewebe-Systeme mit Anwendung der im Vorangehenden begründeten Terminologie.

Der Uebergang vom „concentrischen“ zum Collateral-Bündel wird

1) Entstehung und Wachsthum der Wurzeln, p. 88. In dem 4. Heft der Beiträge zur wiss. Botanik von Nägeli. München, 1867.

2) l. c. p. 61, 79, 81, 85.

3) V. U. p. 104.

4) V. U. p. 95, Anm. 2, p. 19, 99, 104.

5) V. U. p. 104.

6) l. c. Tafel V, Figur 19.

7) Coll. Gef.

nach Haberlandt¹⁾ gewöhnlich schon in den Hauptnerven der Wedelspreite allmählich vorbereitet. Der Hadromtheil verlässt immer mehr und mehr seine centriscbe Lage, und, der morphologischen Oberseite des Wedels zustrebend, drängt er das oberseits gelegene Leptom bei Seite. „So kommt nun zunächst ein excentrischer Bau des Gefässbündels zu Stande. Das Hadrom wird oberseits nur von einer dünnen Leptomschichte bedeckt, welche seitlich in die mächtig ausgebildete Leptomschichte der Unterseite übergeht. Schliesslich wird das Leptom der Oberseite ganz durchbrochen und das Gefässbündel ist collateral geworden.“ Die schwachen und schwächsten Bündel des Blattes von *Osmunda regalis* behalten auf der Oberseite des Hadroms eine ununterbrochene Lage von „Leptom-(Cambiform-)Zellen“. Zwischen den Hydrom-Elementen fand Haberlandt²⁾ weder Parenchymzellen noch Stereiden. Das erstere ist nach dem im Abschnitt 4: Das Hadrom, Gesagten leicht erklärlich, da die schwachen in Rede stehenden kleinen Blattbündel auch nur schwache Hydromstränge besitzen. Ob die weiteren Elemente, welche sich bei stärkerer Ausbildung zwischen engeren „Cambiformzellen“ finden, als Siebröhren anzusprechen sind, lässt der genannte Autor³⁾ dahingestellt. Die zartesten Bündel bestehen ausschliesslich aus Hydroiden.

Entweder verdicken sich blos die an die Endodermis grenzenden Wandungen der benachbarten Zellen und werden sklerotisch, oder das Bündel wird von einer einfachen oder mehrschichtigen Scheide aus mechanischen Zellen umschlossen, wie bei *Aspidium aculeatum*, *Polypodium vulgare* und *Scolopendrium vulgare*⁴⁾.

Da Haberlandt, wie wir früher bereits bemerkten, seiner eigenen Terminologie untreu wird, so können wir leider nicht unterscheiden, in wie weit das von ihm als Leptom bezeichnete Gewebe als Cambiform in dem oben definirten Sinne oder als Amylom aufzufassen ist. Wenn von Amylom, wie ich für viele Fälle vermthe, die Rede ist, so würde es angezeigt sein, das Bündel von dem Moment an collateral zu nennen, wo auf der einen Seite der Hydroiden alle wirklichen Leptom-Elemente verschwunden sind, weil das an dieser Stelle etwa zurückgebliebene Amylom aus physiologischen Gründen besser zu den Hydroiden gezogen wird. Bei *Scolopendrium vulgare* kommt auf der Hydromseite der schwächeren Blattbündel eine Lage „Cambiform“ vor, und Haberlandt⁵⁾ nennt daher diese Bündel nur excentrisch, aber nicht collateral.

Ob die collaterale Anordnung des Leptoms und Hadroms in den

1) Coll. Gef. p. 125, 126.

2) Coll. Gef. p. 128.

3) Coll. Gef. p. 128.

4) Coll. Gef. p. 131.

5) Coll. Gef. p. 134.

Blatttheilen aus Zweckmässigkeitsgründen geschieht, wissen wir nicht. Man könnte sich etwa denken, dass die Hydromtheile desshalb nach der Oberseitegewendet erscheinen, weil diese leicht stärker verdunstet als die Unterseite. Es muss daher für das Gewebe der Oberseite vortheilhaft sein, das Gewebe, welches für Wasserzufuhr sorgt, oder welches das Wasserreservoir darstellt, so nahe als möglich zu haben.

B. Die einzelnen Gruppen der Gefässkryptogamen.

Die Angaben im Folgenden beziehen sich lediglich auf die Leitbündel im Stamm und im Petiolus.

In der systematischen Gliederung bin ich dem von Eichler in seinem Syllabus¹⁾ gegebenen System gefolgt.

1. Equisetaceae.

Stamm-Bündel collateral. Der vom Mark abgewendete, aus Siebröhren, Protoleptom und nach De Bary auch aus Cambiform zusammengesetzte Leptomtheil wird an den beiden radialen Seiten von wenigen Hydrom-Elementen begleitet und grenzt an einen grossen, nach der Angabe der Autoren schizogen entstehenden, Intercellularraum, an dessen radialen Seiten sich ebenfalls einzelne, wie J. Duval-Jouve²⁾, R. Sadebeck³⁾ u. a. angeben, zum Theil resorbirte, also nicht mehr funktionirende Hydroiden befinden. Das Uebrige wird von Amylom eingenommen, welches, wie bei den meisten *Liliaceen*, ohne scharfe Grenze in das dickwandige Grundparenchym übergeht.

Die Hydroiden werden von Amylom umgeben, und auch die Siebgefässe sind nach Russow⁴⁾ theilweise durch Amylomzellen getrennt. Der ganze die Leitbündel enthaltende centrale Theil wird bekanntlich häufig von einer äusseren gemeinsamen Schutzscheide umschlossen und zuweilen auch durch eine innere Scheide vom Centrum abgegrenzt. Bei manchen Arten (z. B. Rhizom von *Equisetum litorale*) kommen nach E. Pfitzer⁵⁾ Einzelscheiden vor.

2. Lycopodiaceae.

Der centrale cylindrische Strang der *Lycopodium*-Stämme enthält mit einander anastomosirende Hydromplatten, welche die Neigung haben, namentlich bei *Lycopodium Selago*, einen auf dem Querschnitt sternförmigen Hydromtheil zu bilden. Die Platten sind von einander

1) Berlin, 1880, p. 16—18.

2) Histoire natur. des Equis. de France. Paris, 1864, p. 39.

3) Die Gefässkryptogamen in Schenk's Handb. der Botanik. Breslau, 1880, p. 289.

4) Vergl. U. p. 140—142.

5) Ueber die Schutzscheide der deutschen Equisetaceen. In Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Bot. Leipzig, 1867—1868, VI, p. 297—362.

durch ein sehr plasmareiches, länglich parenchymatisches bis prosenchymatisches, soweit ich bei *Lycopodium annotinum* gesehen habe, porenloses Gewebe getrennt, welches vielleicht trotz seiner Dickwandigkeit, wegen der Inhaltsbeschaffenheit als Cambiform zu bezeichnen ist. Zwar giebt Dippel an, dass die Grundmasse der *Lycopodium*-Bündel ein „enges derbwandiges, langgestrecktes, Stärke führendes Parenchym“ sei, allein weder F. Hegelmaier¹⁾ noch Russow²⁾ noch ich selbst (ich untersuchte *Lycopodium alpinum*, *annotinum*, *clavatum* und *Selago*) haben in den zwischen den Hydroiden befindlichen Zellen Stärke auffinden können. Russow und De Bary³⁾ geben als Inhalt nur ein gelbliches Oel an, und dies würde allerdings wieder dafür sprechen, dass das in Rede stehende Gewebe besser als Amylom aufzufassen sei, weil ja Oel als Aequivalent für ein Kohlenhydrat gelten kann. Jedenfalls ist dies Gewebe aber von dem charakteristischen übrigen unzweifelhaften Amylom, welches ausserdem in den *Lycopodium*-Bündeln vorkommt, zu unterscheiden. Nach Hegelmaier⁴⁾ nämlich tritt nur vorübergehend Stärke in feinen Körnchen auf in der „Phloëmscheide“, also in dem Gewebe, welches zu äusserst die Bündel umgiebt, und ich selbst habe an Präparaten von *L. annotinum*, die mir Herr stud. phil. M. Brandt vorlegte, in dem bezeichneten Gewebe ebenfalls Stärke konstatirt. Diese Zellen besitzen nun auch daneben, wie ich wenigstens ebenfalls bei *Lycopodium annotinum* fand, einfache runde Tüpfel, und diese anatomische und Inhaltsbeschaffenheit nöthigt uns, dieses Gewebe als das unzweifelhafte Amylom des Leitbündels aufzufassen. Ausser der Beobachtung Hegelmaier's und dem Vorhandensein von Tüpfeln spricht überdies für die Auffassung dieses Gewebes als Amylom noch die Analogie mit den Bündeln der *Selaginellaceen* — die im nächsten Abschnitt betrachtet werden — welche an der korrespondirenden Stelle ebenfalls ihr Amylom besitzen.

Die mittlere Lage der Cambiformlamellen wird von einzelnen Siebröhren eingenommen, die auf dem Querschnitt an dem grösseren Lumen und ihrer Inhaltslosigkeit leicht kenntlich sind, oder die Siebröhren bilden mit den Hydroidenplatten abwechselnde Lamellen⁵⁾. An den Membranen fand ich bei *Lycopodium annotinum* einfache runde kleine Tüpfel.

Eine Schutzscheide scheinen viele Arten zu entbehren; jedoch müssen über das Fehlen oder Vorhandensein dieses Organes noch weitere Untersuchungen angestellt werden. Nach Russow⁶⁾ ist die

1) Botan. Zeitung. Leipzig, 1872, Spalte 777.

2) Vergl. U. p. 129.

3) Vergl. Anat. p. 364.

4) Botan. Zeitung. Leipzig, 1872, Spalte 777.

5) cf. Janczewski, Tubes crib. p. 234.

6) Vergl. Unt. p. 129—130.

ein- bis dreischichtige Scheide innerhalb des Stereoms als Schutzscheide oder wenigstens als Analogon derselben aufzufassen.

Zufolge der gegebenen Darstellung kann man also sagen, dass die *Lycopodium*- und, wie wir sehen werden, die *Selaginella*-Bündel im Centrum ausschliesslich aus Hydrom und Leptom bestehen und in ihrer Peripherie aus Amylom.

Bei einem ausländischen *Lycopodium* (*L. cernuum*) fand ich einen unregelmässig von Leptomsträngen unterbrochenen centralen Hydroiden-Cylinder. Das Leptom besteht aus gestreckt-parenchymatischen, die Hydroiden berührenden Zellen mit reichlichem Plasma. Die Siebelemente lagen an einigen Stellen den Hydroiden unmittelbar an.

Abweichend ist nach Russow¹⁾ und De Bary²⁾ der Bündelbau der oberirdischen Aeste von *Psilotum*. Ein triarcher bis pentarcher und octarcher Hydromkörper wird in seinem Centrum von einem Stereomstrang durchzogen. Die übrige von einer Schutzscheide umgebene Partie besteht aus zartwandigem, prismatischem Parenchym, und in diesem, zumal in der Peripherie zwischen den Hydromstrahlen finden sich zerstreut wenigzellige Gruppen von etwas engeren und dickwandigen Siebröhren. Auch das Centrum der *Tmesipteris*-Bündel³⁾ wird „von dickwandigen, lang gestreckten, schräg gestutzten Zellen eingenommen . . . , mit zahlreichen, sehr grossen Tüpfeln“.

Mit Ausnahme von *Lycopodium inundatum* besitzen die *Lycopodium*-Arten nach Russow⁴⁾ eine aussen von der Endodermis (?) liegende mehrschichtige Stereomscheide, die bei *L. annotinum* die ganze Rinde überhaupt einnimmt.

Das Gewebe, welches wir oben am ehesten noch als Cambiform ansprechen zu dürfen glaubten, übernimmt in dem vorliegenden Falle die Funktion, welche sonst allgemein den Amylom-Elementen zukommt, da es offenbar das typische Amylom vertritt, welches bei den übrigen Farngewächsen die Hydroiden begleitet, um den Saft-(Wasser-)Austausch zwischen dem Hydrom und dem übrigen saftigen Gewebe zu regeln. Da für diese Aufgabe verlangt wird, dass die parenchymatischen Hydroiden-Begleiter einen lebensfähigen, endosmotisch wirkenden Primordialschlauch besitzen, so ist es gleichgültig, ob Amylom oder Cambiform oder sonst ein dieser Bedingung entsprechendes Gewebe die Hydroiden unmittelbar berührt. Das *Lycopodiaceen*-Cambiform scheint mehr ein Gewebe zu sein, welches zusammen die Funktionen verrichtet, in welche sich sonst das Amylom und das Cambiform theilen. Es berührt bei den *Lycopodiaceen* nicht nur unmittelbar die

1) V. U. p. 131—132.

2) V. Anat. p. 362.

3) V. U. p. 131—132.

4) V. U. p. 130.

Hydroiden, sondern auch die Siebröhren und zeigt hiermit an, dass es wahrscheinlich zu diesen beiden Bündel-Elementen in einer Beziehung steht.

3. Selaginellaceae.

Mit Ausnahme der Wurzel fehlt in den übrigen Organen die Endodermis bei den *Selaginellen*¹⁾; sonst gilt der für *Lycopodium* beschriebene Bau im Wesentlichen auch für diese Familie.

Das Hydrom ist diarch bis polyarch.

Janczewski²⁾ hat in dem bei den *Lycopodiaceen* Cambiform genannten Gewebe bei *Selaginella Martensii* ebenfalls keine Stärke und kein Chlorophyll gefunden. Er beschreibt die Zellen als dünnwandig und tüpfellos, von länglicher Form, mit granulösem Plasma, so dass auch hier, wie mir scheint, von einem Cambiform gesprochen werden darf. Dies Cambiform umgibt bei der genannten Art die diarche Hydromplatte und wird seinerseits von einer gewöhnlich zweischichtigen Lage von Sieb-Elementen umgeben, die an den Polen der Hydromplatte fehlen. Das Cambiform stösst hier unmittelbar auf Zellen des Gewebes, welches das ganze Bündel umgibt. Die Zellen des letzteren sind dickwandiger als die Siebröhren, mit runden Tüpfeln und mehr oder weniger geneigten Querwänden versehen. Der Inhalt besteht aus Plasma und Chlorophyllkörnern mit kleinen Einschlüssen von Stärke. Wegen der Tüpfel und des Inhalts möchte ich dieses Gewebe als Amylom ansprechen.

Die Bündel mit diarchem Hydrom sind nach dem Gesagten bicollateral zu nennen.

4. Isoëtaceae.

Auch hier fehlt nach Russow³⁾ in den Stamm- und Blattorganen den Bündeln die Endodermis. Die Blattbündel sind collateral, die Stammbündel concentrisch gebaut.

Der axile Stammstrang besitzt ein centrales Hadrom. Dass die nach De Bary⁴⁾ unregelmässig zwischen die Hydroiden gelagerten zartwandigen Parenchymzellen Amylom sein werden, schliesse ich aus Analogie, da nach Janczewski⁵⁾ die Hydroiden der Blattbündel von *Isoëtes Durieui* durch Amylom von einander getrennt sind. Das Hadrom scheint nach Russow⁶⁾ und De Bary⁷⁾ von einer Lage Leptom um-

1) De Bary, l. c. p. 359.

2) l. c. p. 246—248.

3) V. U. p. 140.

4) V. Anat. p. 361.

5) l. c. p. 250.

6) Sachs, Lehrb. I. Aufl. 1868, p. 383. — V. U. p. 139.

7) l. c. p. 361.

geben zu sein, welches durch ein Rindenmeristem¹⁾ von der Rinde abgeschlossen wird. Die Leptomzellen beschreibt De Bary²⁾ als kurzprismatisch oder tafelförmig, mit wasserhellem Inhalt, die Membranen mit breiten sehr zarten Tüpfeln, aber nicht mit deutlichen Siebporen. Russow³⁾ sagt von den Wänden, dass sie deutlich verdickt und fein getüpfelt seien.

Nach Janczewski⁴⁾ besteht die Grundmasse der Blattbündel von *Isoëtes Duriei* aus Amylom. Das Centrum wird von drei Luftgängen eingenommen, welche die Ecken eines gleichschenkeligen kleinen Dreiecks einnehmen. Die Gänge werden von Endodermis-Zellen umgeben. Ausserhalb der beiden Schenkel des Dreiecks liegt im Amylom je eine Protoleptomplatte; die dritte Seité geht parallel dem Hadrom. Die Protoleptomgruppen zeigen auf ihren äusseren Seiten einige kleine dünnwandige Zellen mit gleichem Inhalt wie die Protoleptomzellen, deren feineren Bau Janczewski jedoch nicht zu erkennen vermochte. Vielleicht sind sie als Cambiformzellen anzusprechen.

5. Hymenophyllaceae.

Bündel mit Endodermis. Siebröhren oder ähnliche Elemente konnte Prantl⁵⁾ bei keiner Pflanze der ganzen Familie auffinden. Die Grundmasse besteht nach dem genannten [Autor aus dünnwandigem „Cambiform“, dessen Zellen von langgezogener Gestalt sind mit geraden oder etwas schiefen Querwänden. Da der Inhalt dieses Gewebes aus reichlichem Plasma und Stärke besteht, so ist dasselbe das Amylom der Leitbündel. In den oberirdischen Organen enthält das Amylom auch Chlorophyll (*Hymenophyllum nitens*). Auf der einen Seite wird das Amylom der meist collateralen Blattstränge von einem Hydroidenstrang durchzogen, der häufig von Amylomzellen durchsetzt ist; die andere Seite wird von einem Strang aus „Bastzellen“, wie Prantl sie nennt, eingenommen. Diese Bastzellen sind, wie ich konstatierte, Protoleptom und somit nach dem früher Gesagten sehr wahrscheinlich zu den Siebröhren zu rechnen.

Stereom, den Hydroiden anliegend, tritt nach Prantl⁶⁾ in den Bündeln in den Sectionen *Davalliopsis* und *Feea* auf; ausserdem werden die Blattbündel häufig von einem Stereomcylinder umgeben, so dass wir Stereo-Mestom-Bündel erhalten.

Der centrale Strang der Stammtheile von *Hemiphlebium* ist ebenfalls collateral. In dem peripherischen Amylom der bei den übrigen

1) Sachs l. c. — V. U. p. 139.

2) l. c. p. 361.

3) Sachs, Lehrb I. Aufl. 1868, p. 383. — V. U. p. 139.

4) l. c. p. 250—252.

5) Hymenophyllaceae p. 17.

6) Hymenophyll. p. 22.

Gattungen concentrischen Bündel finden sich isolirt „Bastzellen“, die bei den höheren Arten „als mehrfache ununterbrochene Schicht auftreten“.¹⁾

Da nun im Allgemeinen ein Zusammenhang zwischen allen Amylom-Elementen vorhanden ist, untersuchte ich von den „höheren Arten“ das Rhizom von *Hymenophyllum nitens*. Es macht hier allerdings zuerst den Eindruck, als ob die Protoleptomzellenschicht einen continuirlichen „ununterbrochenen“ Cylinder darstellt, allein eine eingehende Untersuchung ergibt, dass gewöhnlich an zwei gegenüberliegenden Stellen eine Communication der äusseren und inneren Amylomalagen durch gleichnamige Elemente stattfindet. Die *Hymenophyllaceen* bieten daher ebenfalls keine Ausnahme von der obigen Regel.

Die centrale Amylompartie wird von mehr oder weniger in Gruppen vereinigten Hydroiden durchzogen. Die unmittelbar dem Protohydrom anliegenden Amylomzellen „zeichnen sich durch weiteres Lumen und durch eigenthümliche Aussackungen aus“²⁾, so dass sie als Lückenparenchym gelten können.

6. Polypodiaceae.

Es wurde im Vorausgehenden schon mehrere Male darauf hingewiesen, dass den *Polypodiaceen* allgemein irrthümlicher Weise concentrische Leitbündel zugeschrieben werden, und De Bary³⁾ nennt bekanntlich sogar den concentrischen Bau den Farntypus, während thatsächlich, vielleicht in den meisten Fällen, die Leitbündel — wenigstens die der Rhizome — bicollateralen Bau aufweisen. An der von De Bary in seiner vergleichenden Anatomie gegebenen Figur 160 (auf p. 356) eines Querschnittes durch ein Rhizombündel von *Polypodium vulgare* kann man auch — wenn man die Zusammensetzung der *Polypodiaceen*-Leitbündel einmal genau kennt — die Bicollateralität erkennen. Jedoch sind in der Figur die Amylomelemente und die Leptomzellen nicht von einander unterschieden dargestellt, so dass es hierdurch den Anschein hat, als ob um das centrale Hydrom ein ununterbrochener Mantel gleichartigen Gewebes (Phloëm) sich herumzöge.

Unsere Figur 13 giebt eine Darstellung der Querschnitts-Ansicht eines typischen *Polypodiaceen*-Rhizom-Leitbündels. Das Lumen der Amylom-Elemente (Holzparenchym) ist zur Unterscheidung von den ausschliesslich Eiweissstoffe leitenden Leptomzellen schraffirt dargestellt. Im Centrum erblicken wir ein Hydrom: nämlich einen Hydroidenstrang mit einem denselben allseitig umgebenden Amylommantel und einigen zwischen die Hydroiden gelagerten Amylomzellen. Dem Amylom-

1) Prantl, Hym. p. 26—27.

2) Hymenophyll. 19.

3) l. c. p. 359.

mantel anliegend befindet sich auf jeder der Breitseiten des Hadroms je eine Leptomsichel (L), deren Aussenseiten aus dickwandigem Protoleptom besteht, dessen Zellen ich für die physiologischen Aequivalente der Siebröhren halten möchte. Das übrige Leptomgewebe scheint Cambiform zu sein. Die nicht von Leptom eingenommenen beiden gegenüberliegenden Stellen des Hadroms beim Protohydrom (Ph) stehen mit dem Amylomcylinder, welcher das ganze Bündel innerhalb der Endodermis (E) umgiebt, in Verbindung, so dass das Amylom des Hadroms (Xylems) und dasjenige des Phloëms, d. h. des Amylo-Leptoms, also die Xylem- und Phloëmscheide an den bezeichneten beiden Längsstreifen mit einander communiciren. — Vgl. auch die Figuren-Erklärung.

Wie bereits früher bemerkt wurde, sind im allgemeinen den Hydroiden dann Amylom-Elemente zwischengelagert, wenn die Hydroidenschicht eine grössere ist. Beispiele hierfür anzugeben ist kaum lohnend; man findet solche z. B. in Russow's Vergleichenden Untersuchungen (p. 101).

Schon Janczewski¹⁾ macht auf den bicollateralen Bau der Rhizombündel von *Polypodium vulgare* und *Pteris aquilina* aufmerksam, und dieser Autor giebt an²⁾, dass im Rhizombündel von *Aspidium Filix mas* mit dreistrahligem Hydroidenstrang auch drei Leptomtheile im Amylom auftreten. — Untersucht habe ich und übereinstimmend bicollateralen Bau gefunden Arten aus den Gattungen *Adiantum*, *Aspidium*, *Polypodium* und *Pteris*.

In den Blattstielen scheinen jedoch häufig oder gewöhnlich die Pole der Hadromplatten von Leptom umzogen zu werden, so dass dasselbe die Hydroiden fast continuirlich umgiebt. Nur hier und da wird das Leptom von Amylom-Elementen durchbrochen, und sämtliche Amylomzellen des Bündels bleiben daher trotzdem unter einander verbunden. Bei *Adiantum trapeziforme*, *Blechnum Spicant*, *Onoclea sensibilis*, *Asplenium angustifolium* und anderen stehen die inneren (Xylemscheide) und äusseren (Phloëmscheide) Amylom-Elemente besonders oder ausschliesslich auf der concaven Seite des Bündels mit einander in Verbindung.

Eine Endodermis grenzt die Bündel des Blattstieles und des Rhizoms entweder nach aussen allein ab, oder derselben liegen noch lokalmechanische Stereombelege in Form von Strängen oder in Form eines ein- bis mehrschichtigen Stereomcylinders an. Häufig findet sich eine einschichtige Scheide mit nach innen einseitig verdickten Membranen. Aehnlich wie bei den baumförmigen *Cyatheaceen* umgiebt im Rhizom von *Polybotria Meyeriana* ein mehrschichtiger Stereomcylinder das Bündel, jedoch so, dass zwischen Endodermis und Stereomscheide der

1) l. c. p. 217, 221.

2) l. c. p. 219—220.

grösseren Bündel stellenweise stärkeführendes Grundparenchym verbleibt. — Dass in seltenen Fällen (*Adiantum trapeziforme*) innerhalb der Mestomelemente echte Stereiden vorkommen, wurde bereits ausführlich in dem Abschnitt über das Stereom erörtert.

Ueber das in den Winkeln der Hydroiden nicht selten vorhandene Lückenparenchym wurde ebenfalls bereits früher gesprochen.

7. Cyatheaceae.

Im Gegensatz zu den *Polypodiaceen* würde hier nach der Beschreibung Janczewski's¹⁾ im Rhizom von *Dicksonia rubiginosa* eine ein- bis zweischichtige Siebröhrenlage continuirlich das nach Analogie Amylom zu nennende Gewebe in einen äusseren (Phloëmscheide) und einen inneren (Xylemscheide) Mantel trennen; ich vermüthe jedoch, dass diese Amylomtheile durch das Leptom hindurch mit einander communiciren. Nach Dippel²⁾ kommen Siebröhren im Bündel des Wedelstieles von *Cyathea microlepis* vorzugsweise oder einzig auf der convexen Seite des halbmondförmigen Leitbündels vor, und es wird daher an der concaven Seite die Communication des Amyloms stattfinden.

Ob man übrigens hier von einem Amylom reden darf, muss dahin gestellt bleiben. Die Autoren sagen über den Inhalt der in Rede stehenden parenchymatischen Bündelzellen nichts aus, und ich selbst habe in den untersuchten *Alsophila*-Stämmen aus dem hiesigen Königl. botanischen Museum und botanischen Garten niemals innerhalb der Schutzscheide Stärke gefunden. Die zwischen den Hydroiden vorhandenen und die übrigen ausserhalb derselben befindlichen Parenchymzellen des Phloëms, die mit den Amylom-Elementen zu vergleichen wären, zeigten immer nur einen sehr reichlichen Plasma-Inhalt. Es kann jedoch sein und es ist nach Analogie sogar wahrscheinlich, dass die Stärke nur vorübergehend verbraucht war. Es ist hier um so gebotener vorsichtig zu sein, als beispielsweise H. Schacht³⁾ verleitet wurde auszusprechen, dass sich bei den Farnkräutern in den Zellen des Gefässbündels niemals Stärkemehl vorfindet. Offenbar hat dieser Autor ganz zufällig immer nur Bündel zu Gesicht bekommen, deren Stärkebestandtheile gelöst worden waren.

Zwischen der Endodermis und dem mehrschichtigen Stereombeleg, der nur gewöhnlich an den Polen des Bündels unterbrochen ist, findet sich reichlich Stärke führendes Grundparenchym, welches nach Russow⁴⁾ einzelne grosse Gummizellen führt. Die Stereom-Bekleidungen der Bündel dienen gleichzeitig als biegefestes Gerüst der aufrechten

1) l. c. p. 216.

2) Zus. d. Gef. p. 144.

3) Lehrb. d. Anat. u. Phys. d. Gew. I, Berlin, 1856, p. 320.

4) V. U. p. 104–105.

Stämme und erhöhen, worauf ich schon früher aufmerksam machte¹⁾, bei manchen Arten durch ihre wellblechförmige Construction die Festigkeit um ein Beträchtliches. Auch der Stereomcylinder von *Dicksonia rubiginosa* enthält nach Janczewski²⁾ Parenchymzellen, die sich namentlich in die Nachbarschaft der Endodermis gruppieren. Im Blattstiel von *Alsophila* liegt die Stereomplatte der Schutzscheide nach Russow³⁾ an.

Auch hier findet sich in den Längsfurchen der Hadrombänder oft Lückenparenchym.

8. Gleicheniaceae.

Die Bündel der von Russow⁴⁾ untersuchten *Gleichenia*-Arten zeigten übereinstimmenden Bau mit den Bündeln der *Hymenophyllaceen* mit der Abweichung, dass er in den Blattstielbündeln der beiden allein von ihm untersuchten Arten *Gl. dichotoma* und *polypodioides* Stereiden den Hydroiden anliegend oder durch Amylom von denselben getrennt gefunden hat. Bei *Gl. polypodioides* liegen diese Stereomzellen „in den Winkeln der nach innen umgebogenen Schenkelenden des V-förmigen Xylemquerschnitts und an der Aussenseite der abgerundeten Spitze des Xylems, in welcher die Schenkel zusammenstossen“. Bei *Gl. dichotoma* sind die Stereiden entsprechend gestellt, und ausserdem besitzen die Bündel dieser Art ausserhalb der Endodermis einen zwei- bis dreischichtigen Cylinder aus Skeletgewebe.

Die Bündel eines von mir untersuchten *Gleichenia*-Rhizoms (*Gl. Mendelii* des Berl. bot. Gartens) besaßen ein centrales Hadrom mit einem stark entwickelten Amylom, und dieser Theil wurde von einem in ein Amylom eingebetteten Leptom umgeben.

9. Schizaeaceae.

Nach Prantl⁵⁾ hat das nicht von Amylom-Elementen durchsetzte Hydrom auf dem Querschnitt der Blattstiele der *Schizaea*-Arten mehr oder minder ankerförmige Gestalt. Durch Amylom getrennt oder den Hydroiden unmittelbar angrenzend liegen in den beiderseitigen Conca- vitäten des Hydroms Stereomstränge. Von einzelnen Amylomzellen unterbrochen liegt in einem Halbkreis auf der den Ankerzinken gegenüberliegenden Seite des Bündels eine Reihe enger Siebröhren, von denen die dem Stereom am nächsten befindlichen mit diesem in unmittelbare Berührung treten können. Die Bündel sind also collateral.

1) Das mechanische Gewebesystem der Pflanzen. In „Kosmos“ herausg. von E. Krause, Stuttgart, 1882, XI, p. 181—182.

2) l. c. p. 216.

3) V. U. p. 104—105.

4) V. U. p. 6, 96—97.

5) Schizaeaceae, p. 23—31.

Das Ganze wird von einem Amylomcylinder, dieser von einer Endodermis und diese bei manchen Arten von einem Skelettcylinder umschlossen. In dem Bündelstück, welches durch die Blattbasis läuft, fehlen die Stereiden des Bündelinnern.

In den concentrischen Strängen der Stämme folgen von aussen nach innen nacheinander folgende Gewebe-Arten. Zuerst eine Endodermis, dann Amylom, eine bis zwei Lagen Siebröhren, wieder Amylom und endlich das Hydrom. Das letztere umschliesst bei *Schizaea*-Arten ein centrales Amylom, welches bei *S. elegans* dickwandig, also der Zugfestigkeit angepasst erscheint. Diesen centralen Markparenchym-Cylinder rechnet man am besten, wie wir früher bemerkten, zum Bündel, weil es nach dem Vorbergehenden sehr nahe liegend ist anzunehmen, dass die Elemente desselben in derselben physiologischen Beziehung zu den Hydroiden stehen wie die Amylom-Elemente, welche in den anderen Fällen die Hydroiden umgeben und zwischen diesen sich finden.

Die markumschliessenden Stränge von *Aneimia* besitzen einen doppelten, inneren und äusseren Ring von Siebröhren. In den breit-V-förmigen collateralen Blattstiel-Bündeln von *A. Phyllitidis* wiederholt das centrale Hydrom die Gestalt des Bündels. Auf der concaven Seite des V-Hydroms, nämlich an den Schenkelenden und in dem V-Winkel befindet sich das Protohydrom und diesem anliegend Lückenparenchym. Von zahlreichen Amylomzellen durchsetzt umziehen die Siebröhren die convexe Hydromseite und bilden ausserdem noch je eine ebenfalls von Amylom durchsetzte isolirte Gruppe gerade vor den Erstlingshydroiden der Schenkel. Stereiden finden sich theils die Siebröhren und Hydroiden unmittelbar berührend oder von ihnen durch Amylom getrennt an der convexen V-Spitze und an den beiden Schenkelenden; sie wurden von Prantl vermisst in den Leitbündeln von *A. Dregeana*, *Gardneri*, *lanuginosa* und bei *Mohria*, welche letztere Gattung im Bau der Stränge sich wie *Aneimia* verhält. Zu äusserst findet sich Amylom und eine Endodermis. Die Petiolus-Leitbündel von *A. coriacea* besitzen zwei divergirende Hydrombänder, die auf ihren beiden Breitseiten je eine Gruppe von Siebröhren aufweisen, welche durch Stereiden von den Hydroiden geschieden werden.

Der centrale, ohngefähr prismatisch-dreiseitige Hydroidenstrang von *Lygodium* ist von reichlichem Amylom (mit Chlorophyllinhalt) durchsetzt. Je ein Strang Siebröhren mit Amylom folgt den Prismaflächen. Die Siebröhren grenzen entweder direkt an die Hydroiden oder sind von Amylom davon getrennt. Das Ganze umgiebt ein Amylomcylinder und eine Endodermis. Im Stamm sind die genannten Gewebearten regelmässig concentrisch in der gleichen Aufeinanderfolge geordnet. Nur bei *L. flexuosum* und sehr vereinzelt bei *L. volubile* fand Prantl den Hydroiden beinahe unmittelbar angrenzend Stereiden.

In dem Winkel zwischen den beiden Schenkeln des Petiolusstranges

von *Mohria* liegt ein Skeletbündel. Bei vielen *Lygodium*-Arten wird das Blattbündel von einem Skeletcylinder umschlossen, der ganz allmählich in ein zwar sklerenchymatisch bleibendes, aber doch dünnwandigeres Parenchym übergeht.

10. Osmundaceae.

Das centrale Hydrom des C-förmigen Blattstielbündels von *Osmunda regalis* ohne Amylom. Zwischen der Schutzscheide und dem Hydrom in dem das letztere umgebenden Amylom Siebelemente, die nach Dippel¹⁾ vorzugsweise oder einzig an der convexen Seite des Leitbündels erscheinen. Auf der concaven Seite treten nach Russow²⁾ an 10—12 Punkten der Phloëmscheide gruppenweise mehrere Amylomzellen auf, die durch ihr weites Lumen, welches das der benachbarten Zellen um das 4—5fache übertrifft, ausgezeichnet sind. Der concaven Seite der Endodermis liegt im basalen Theil des Petiolus ein Skeletstrang an.

Das Bündel des Rhizoms derselben Art besitzt nach De Bary³⁾ direkt an das Markparenchym grenzende hufeisenförmige bis keilförmige Hydromstränge mit wenig eingeschobenem Amylom, die von einander durch 6—10schichtige Markstrahlen getrennt sind. In diesen finden sich nach Janczewski⁴⁾ zerstreut einige Siebröhren, die nicht mit den Siebröhren der Bündel-Peripherie, die sich ein Stück in die Markstrahlen hineinziehen, zusammenhängen. Ausserhalb des die Hydromstränge gemeinsam umgebenden Amyloms findet sich nach De Bary eine fast ununterbrochene Lage grosser Siebröhren. „Direkt an die Siebröhrenschicht grenzt dann nach aussen eine Schicht quer-gestreckter, zum Theil derbwandiger Elemente.“ Ausser von dieser Zone verläuft eine Endodermis.

Die *Todea*-Bündel³⁾ gleichen im Wesentlichen denjenigen von *Osmunda*. Bei *Todea africana* sind auch auf der concaven Leitbündelseite in dem untersten Theile des Blattstiels Siebröhren vorhanden.

11. Marattiaceae.

Die mit Ausnahme der Wurzeln gewöhnlich schutzscheidelosen, meist plattenförmigen Bündel besitzen ein centrales Hydrom, welches Amylom zwischen sich aufweist, wenn die Hydroidenmasse grösser wird. Beim

1) Zusammensetzung d. Gefässbündel p. 144.

2) V. U. p. 99

3) l. c. p. 360—361.

4) l. c. p. 228.

Protohydrom findet sich nach Russow¹⁾ Lückenparenchym. Sonst wie gewöhnlich. — Vergl. De Bary's Vergleichende Anatomie²⁾).

Nach H. G. Holle³⁾ kommt bei *Danaea* auch im Stamm und im Blattstiel eine „Strangscheide“ vor.

12. Ophioglossaceae.

Nach Russow⁴⁾ besitzen die Blattleitbündel keine Endodermis; bei *Ophioglossum vulgatum* fehlt dieselbe auch im Rhizom.

Die Bündel sind in den Blatttheilen von *Ophioglossum collateralis*, in denjenigen von *Botrychium*, wie Sachs⁵⁾ angiebt, concentrisch. Im Stamm verschmelzen die Blattbündel zu einem Hohlcyylinder oder bilden in demselben ein hohlcyllindrisches Maschenwerk. Die Hydroiden sind nur im Rhizom und auch da nach Russow⁶⁾ nicht bei *Ophioglossum vulgatum* mit Amylom untermengt. Ausserhalb des Hydroms erscheinen nach Janczewski⁷⁾ Siebröhren anscheinend ordnungslos dem Amylom eingelagert. — Bei *Botrychium rutaefolium* wird der Hydroidenring des Rhizoms von einschichtigen Amylom-Markstrahlen durchsetzt, die mit dem Amylom des Siebtheils in Verbindung stehen⁸⁾. Den Hydroiden unmittelbar aussen anliegend findet sich bei dieser Art, wie wir früher schon erwähnten, ein Cambium. Auf den dann aussen folgenden mit den Markstrahlen communicirenden Amylommantel folgt, wie Janczewski⁹⁾ zeigte, ein continuirlicher Cylinder von dickwandigen, weitlichtigen Siebelementen, die nach Russow im fertigen Zustande von den angrenzenden Amylomzellen nicht scharf zu unterscheiden sind und die von diesem Autor als Protophloëm bezeichnet werden.

Der Markcyylinder wird von keiner Endodermis abgegrenzt.

13. Marsiliaceae.

Die Stammleitbündel bilden bei den *Marsiliaceen* einen durch eine Endodermis von einem centralen Markparenchym oder oft Stärke führenden, zugfesten Stereomstrang getrennten Hohlcyylinder, der gegen das äussere umgebende Grundparenchym ebenfalls durch eine Endodermis abgegrenzt erscheint. Die centrale Bündelpartie wird von einem innen und aussen von Amylomschichten (innere und äussere Xylemscheide) umzogenen Hadrom eingenommen. Die innere und äussere

1) V. U. p. 105–106.

2) p. 359.

3) Bot. Zeitung, 1876, p. 216.

4) V. U. p. 117.

5) l. c. p. 410.

6) V. U. p. 120.

7) l. c. 232.

8) Russow, V. U. p. 119. Tafel VII, Fig. 157.

9) l. c. p. 231.

Xylemscheide stehen zuweilen mit einander durch Amylombrücken, welche den Hydromcylinder durchschneiden, in Verbindung.

Dieses centrale Hadrom wird innen und aussen von je einem Leptommantel umgeben, der jedoch gewöhnlich an einer oder mehreren Stellen durch Amylom unterbrochen wird, welches hierdurch eine Verbindung zwischen den an die äussere und innere Schutzscheide anstossenden Amylommänteln mit den Xylemscheiden herstellt. Die sämtlichen Amylom-Elemente des Bündels hängen also durch gleichnamige Elemente zusammen.

Ueber der Abgangsstelle der Blattbündel steht durch eine Oeffnung in der beschriebenen Bündelröhre das Markparenchym mit dem das Bündel umschliessenden Parenchym in Verbindung, und an diesen Stellen communiciren in dem Leitbündel auch die inneren und äusseren Leptomelemente mit einander, da sich dieselben in den hier auf dem Querschnitt hufeisenförmig erscheinenden Bündeltheilen um die Pole des Hadroms herumziehen.

Wie Russow¹⁾ mittheilt, zeigen mehrere von den Zellen der Xylemscheide, zumal in der Nähe des Protohydroms mannichfache Ausstülpungen, die bis auf Weiteres wohl am besten als Lückenparenchym bezeichnet werden.

In dem dreiseitig prismatischen *Marsilia*-Blattbündel liegen zwei wie im Rhizom gebaute, wie die Schenkel eines V convergirende und sich berührende Hadromplatten. Die Amylomschichten, welche die Pole dieses Hadroms umziehen (Xylemscheide), berühren den an die Schutzscheide anliegenden Amylommantel (Phloëmscheide) in der gleichen Weise wie die Xylem- und Phloëmscheide in den Rhizombündeln der *Polypodiaceen*. Es ist also auch bei den *Marsiliaceen* zwischen sämtlichen Amylom-Elementen eine Communication möglich. Die übrigbleibenden Bündelpartien zwischen den Schenkeln des V und rechts und links von dem V ausserhalb der Schenkel werden von je einem Siebröhrenstrang, untermischt mit Amylomzellen, durchzogen.

Im Wesentlichen den gleichen Bau zeigt nach Russow²⁾ die Gattung *Pilularia*.

14. Salviniaceae.

Der centrale, cylindrische, concentrische Strang im Stämmchen von *Salvinia natans* wird nach Janczewski³⁾ im Centrum von 7 bis 8 Hydroiden durchzogen, die ein stellenweise durch das die Grundmasse darstellende Parenchym (Amylom?) unterbrochenes Hydromband bilden. In dem Parenchym zwischen Endodermis und Hydrom

1) V. U. p. 6 und p. 101—102.

2) V. U. p. 13.

3) l. c. p. 242—243. Tafel V, Figur 1.

liegen zahlreiche mit einander mehr oder minder zusammenhängende Siebröhren.

Im Stammbündel von *Azolla* findet sich nach E. Strasburger¹⁾ ein centrales Hydrom. „Alle Gefässe sind von dünnwandigen langgezogenen Parenchymzellen umgeben, letztere stehen auch im Umkreise des ganzen Bündels.“

Figuren-Erklärung der Tafel.

Fig. 1. Stück einer Stereide aus dem Mestom des Blattstieles von *Adiantum trapeziforme* in der Längsansicht; *a* bei oberer, *b* bei unterer Einstellung. Es geht aus der Richtung der Tüpfel bei den verschiedenen Einstellungen hervor, dass dieselben linksschief angeordnet sind. — Vergrößerung: 320:1.

Fig. 2. Drei successive Querschnitte durch einen kleinen Theil des Hadroms aus dem Rhizom von *Pteris aquilina*. Die correspondirenden (identischen) oder doch nur durch Querwände getrennten Tracheiden sind auf den verschiedenen Schnitten durch die gleiche Bezifferung gekennzeichnet. Auf dem Schnitt *A* sind die beiden Amylomzellen *a b* allseitig von Hydroiden (2, 3, 4, 8) umgeben. Dieselben Zellen oder doch solche, die nur durch Quermembranen von ihnen getrennt sind, stehen auf dem Schnitt *B* durch die Amylomelemente *c d e* mit der ausserhalb des Hadrom umziehenden Amylomzone (Xylemscheide) *f g* in Verbindung. Auf dem dritten successiven Querschnitt *C* endlich schliessen sich den Zellen *a* und *b* auch nach einer zweiten Richtung gleichnamige Elemente (*h i k*) an. — Vergr. 213:1.

Fig. 3. Zwei successive Querschnitte durch einen kleinen Theil des Hadroms aus dem Stammbündel von *Alsophila microphylla* (aus dem Kgl. botan. Museum zu Berlin). Die auf den beiden Abbildungen correspondirenden oder durch Querscheidewände getrennten Hydroiden sind wieder übereinstimmend beziffert. Auf dem Schnitt *A* werden 4 Amylomzellen allseitig von Hydroiden (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) umgeben. Dieselben oder solche, die nur durch Querwände von ihnen geschieden sind, stehen auf dem Schnitt *B* durch gleichnamige Elemente mit dem Amylom ausserhalb des Hadroms in Communication. Die Hydroiden 1, 8, 7, 6 bilden die Grenze des Hadroms. — Vergr. 320:1.

Fig. 4. Drei successive Querschnitte durch einen Hadromtheil aus dem Gelenkpolster des Blattstieles von *Marattia laxa*. Die Membranen, welche die Hydroiden von den Amylomelementen trennen, sind breit dunkel ausgezogen. In *A* wird eine zwei- und eine dreizellige Amylomgruppe allseitig von Hydroiden umschlossen. Auf dem folgenden Querschnitt *B* stehen die beiden Gruppen (oder Zellen, die nur durch Querwände von diesen getrennt sind) untereinander und auch mit den Amylomzellen aus der Umgebung des Hadroms in Verbindung. Bei *C*, dem folgenden successiven Querschnitt, sind die Hydroiden noch weiter auseinander gerückt, so dass die Communication zwischen Aussen und Innen noch auffallender wird. — Vergr. 140:1.

Fig. 5. Stück einer Protoleptomzelle aus dem ganz jugendlichen Blattstielbündel von *Dicksonia antarctica*. Der Bau stimmt mit dem der Siebröhren vollkommen überein. — Vergr. 1375:1 (Immersion).

Fig. 6. Querschnitt durch den ganz jungen Blattstiel von *Adiantum pedatum* an der Grenzstelle zwischen dem Grundparenchym *Gr* und der jugendlichen Bündelanlage. *C* = Coleogen. *Pl* = Protoleptom. — Vergr. 320:1.

1) Ueber *Azolla*, Jena, 1873, p. 28.

Fig. 7. Querschnitt durch den jungen Blattstiel von *Pteris aquilina*. Die Bezeichnung wie bei Fig. 6. — Vergr. 320:1.

Fig. 8. Desgl. von *Pteris tremula*. — Vergr. 320:1.

Fig. 9. Desgl. von *Dicksonia antarctica*. — Vergr. 320:1.

Fig. 10. Querschnitte durch eine an das Grundparenchym grenzende Stelle der jungen Bündelanlage aus dem Rhizom von *Polypodium vulgare*. Gr = Grundparenchym, C = Coleogen, Pl = Protoleptom, Ph = Protohydrom. Auf beiden Schnitten berühren die Protohydromelemente auf der einen Seite das Coleogen und auf der anderen Seite das Procambium. In A ist das Protohydrom durch procambiale Zellen von dem Protoleptom geschieden, in B grenzt das Protohydrom unmittelbar an das Protoleptom. — Vergr. A = 220:1, B = 320:1.

Fig. 11. Desgl. von *Polypodium pustulatum*. Auch hier grenzen die Protohydromzellen Ph an den Hydrompolen der Rhizombündel unmittelbar an das Coleogen C. Protohydrom und Protoleptom berühren sich auf unserem Schnitt. — Vergr. ca. 117:1.

Fig. 12. Drei Längsschnitte durch das Coleogen und die daranstossenden Gewebetheile aus dem ganz jungen Blattstiel von *Dicksonia antarctica*. Gr = Grundparenchym, C = Coleogen, Pr = Procambium, Pl = Protoleptom. — Vergr. 213:1.

Fig. 13. Querschnitt durch ein kleineres Rhizombündel von *Polypodium glaucophyllum*. Die Lumina der Amylomelemente sind zur besseren Unterscheidung von den Leptomelementen schraffirt dargestellt. An den Polen des Hadroms beim Protohydrom Ph steht die den Hydromstrang umgebende Amylomzone (Xylemscheide) mit dem der Schutzscheide E anliegenden Amylommantel (Phloëmscheide) in Verbindung. Dem Letzteren liegen innen zwei gewöhnlich continuirliche, auf dem Querschnitt sichelförmige, schmale, aus kleinen dickwandigen Zellen zusammengesetzte Protoleptombänder an, deren Kanten durch die an den Polen befindlichen Amylomzellen von einander geschieden werden. Zwischen Protoleptom und Xylemscheide befindet sich auf jeder der Breitseiten des Hadroms ein Leptomband L. Das ganze Bündel wird von einer mechanischen Scheide umgeben, die durch Verdickung der dem Bündel zugekehrten Membranen des an die Schutzscheide stossenden Grundparenchyms entsteht. An den beiden Hydrompolen, namentlich bei Ph Ph, ist noch deutlich der Ursprung der vor den Polen liegenden Amylomelemente der Phloë- und Xylemscheide und der in dem gleichen Radius liegenden Schutzscheidezellen aus einer gemeinsamen Mutterzelle zu erkennen. — Vergr. 320:1.














Alle Figuren, mit Ausnahme von Fig. 11, wurden mit dem Prisma aufgenommen.

Verbesserung.

In dem letzten Absatz des Abschnitts III B 6 über die Aufgabe der Endodermis wurden die Marattiaceen irrthümlich als in Blättern und Stamm endodermislos aufgeführt. Vergl. das über *Danaea* Gesagte im Abschnitt IV B 11.

Inhalts-Uebersicht.

	Seite
Vorbemerkung	1
I. Zur Terminologie	1
II. Der Begriff des Leitbündels bei den Gefässkryptogamen	4
III. Die physiologischen Gewebe-Systeme der Leitbündel	6
A. Allgemeines	6
B. Speciellcs	7
1. Das Stereom	7
2. Das Hydrom (Tracheom)	10
3. Das Amylom	12
a. Pteris aquilina	14
b. Alsophila microphylla	15
c. Marattia laxa	15
4. Das Hadrom	17
5. Das Leptom	18
Siebröhren Seite 19; Cambiform Seite 19; Protyleptom (Protophloëm) 20	
6. Die Endodermis (Schutzscheide)	22
Zur Genesis derselben	22
7. Das Cambium	25
8. Das Lückenparenchym	25
Terminologische Schemata für die Begriffe Xylem und Phloëm	25
a. Für die Gefässkryptogamen	26
b. Für die Gefässkryptogamen nach Russow	26
c. Für die nicht in die Dicke wachsenden Phanerogamen	26
d. Für die in die Dicke wachsenden Phanerogamen	26
IV. Anordnung der Gewebe-Systeme der Leitbündel bei den einzel-	
nen Gefässkryptogamen-Familien	27
A. Allgemeines	27
a. Bau der Wurzel-Bündel	27
b. Bau der schwächeren Blattbündel	29
B. Die einzelnen Farn-Gruppen	31
1. Equisetaceen	31
2. Lycopodiaceen	31
3. Selaginellaceen	34
4. Isoëtaceen	34
5. Hymenophyllaceen	35
6. Polypodiaceen	36
7. Cyatheaceen	38
8. Gleicheniaceen	39
9. Schizacaceen	39
10. Osmundaceen	41
11. Marattiaceen	41
12. Ophioglossaceen	42
13. Marsiliaceen	42
14. Salviniaceen	43
Figurenerklärung	44



Separatabdruck aus:

„Jahrbuch des Kgl. botan. Gartens u. botan. Museums zu Berlin. II. 1883.“